



YaraVita™

Amazinc™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo).

Amazinc™

Fertilizante foliar de Manganeso y Zinc
Suspensión concentrada

Inscrito en el SENASA (SAGPYA) bajo el N°: 15.466

Composición Química - total:

25% p/v = 250 g/l Manganeso (Mg) (14% p/p)

35% p/v = 350 g/l Zinc (Zn) (19,5% p/p)



Origen: INGLATERRA

Fabricante: Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, Inglaterra.

Distribuidor: Yara Argentina SA, Av. Del Libertador 498 Piso 16. -C1001ABR- Buenos Aires, Argentina Tel: (011) 51696400 Fax: (011) 51696550

E-mail: info@yara.com.ar

Web: www.yara.com.ar



Atención

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P391: Recoger el vertido.

UN 3082

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (zinc oxide)

10 litros

Peso neto
17,77 kg



YaraVita™ Amazinc™

DOSIS Y EPOCA DE APLICACION

Almendros: 1 a 2 l/ha en apertura de las yemas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Arroz: 1 a 2 l/ha al comienzo de macolla. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Brasicas: Aplicar 1 a 2 l/ha en estado de 4 a 6 hojas. Volumen de agua: 200 l/ha.

Cerezos: 0,5-2 l/ha. Aplicar en yemas de invierno y yemas blancas. 2-3 l/ha, aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Ciруelos: 0,5-2 l/ha. Aplicar en yemas de invierno y yemas blancas. 2-3 l/ha, aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Citricos: Aplicar 2 a 4 l/ha en los flujos de crecimientos de primavera/verano. En ambos casos se puede repetir la aplicación 10 a 14 días después en casos de deficiencia moderada a severa. Volumen de agua: 250 a 1500 l/ha.

Durazneros: 0,5-2 l/ha. Aplicar en yemas de invierno y yemas blancas. 2-3 l/ha, aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Frutillas (En Campo): 1-2 l/ha. Aplicar en el crecimiento de primavera, pudiendo repetir en yemas verdes. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Maiz: 1-2 l/ha. Aplicar entre 4 a 8 hojas. Para deficiencias moderadas repetir esta aplicación entre 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Manzanos: 2 l/ha. Aplicar a apertura de yemas. 2-3 l/ha, aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Nogal: Aplicar 1 a 2 l/ha en brotación. Repetir 15 días después si es necesario. Volumen de agua: 500 a 1000 l/ha.

Papa: Aplicar 1 a 2 l/ha una semana después del 100% de plantas emergidas. Posterior a esto realice análisis de peciolo durante el periodo del llenado de tubérculos. Con deficiencias moderadas a severas, repita aplicaciones en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua: 30 a 250 l/ha.

Perales: 2 l/ha. Aplicar a apertura de yemas. No aplicar en floración. 2-3 l/ha, aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Pimentón (En Campo): Aplicar 1 a 2 l/ha desde 4 a 6 hojas en adelante. Repetir aplicaciones en caso de necesidad a intervalos de 10 a 14 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha. Volumen de agua: 500 l/ha.

Soja: Aplicar 1 l/ha en estado de 4 a 6 hojas. Repetir si es necesario 10 a 14 días después. Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.

Tomates (En Campo): 1-2 l/ha. Aplicar entre 4 y 6 hojas, pudiendo repetir entre 10 y 14 días después. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Uva de Mesa: Uva vinífera: 2-3 l/ha. Aplicar con brotes de 30 cms y repetir 15 días después. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente.

Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACION

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < and <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.