



YaraVita™

Amazinc™ 600



10 litros

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Amazinc™ 600

Fertilizante foliar de zinc y manganeso

Contiene:

35% p/v = 350 g/l de Zinc (Zn)

25% p/v = 250 g/l de Manganeso (Mn)

Floable

Solubilidad en agua - 43% a 20 °C

pH - 9

Densidad 1780 g/L a 20 °C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 50; Cd ≤ 20; As ≤ 20; Hg ≤ 2

Fabricado por **Yara UK Ltd** - Inglaterra

Importado y Distribuido **Yara Chile Fertilizantes Ltda.**

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.

Fono (56-2) : 232 57 12

Atención

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.


P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P391: Recoger el vertido.

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (zinc oxide)



Número de Lote: CLP05M22

Fecha de Fabricación: MM/YYYY

Fecha de Vencimiento: MM/YYYY

YaraVita™ Amazinc™ 600

RECOMENDACIONES DE USO

Almendros: 1 a 2 l/ha en apertura de yemas, repitiendo con frutos cuajados. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Arándanos: Aplicar 2 l/ha justo antes del comienzo de caída de hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Arroz: 1 a 2 l/ha al comienzo de macolla.

Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Brasicas: Aplicar 1 a 2 l/ha en estado de 4 a 6 hojas.

Volumen de agua 30 a 200 l/ha.

Cereales: 1-2 l/ha. Aplicar al comienzo de macolla hasta segundo nodo detectable. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Cerezos, Ciruelos, Damascos, Duraznos, Nectarinas: 1 l/ha.

Aplicar en fruto cuajado y repetir una o dos veces cada 10 a 14 días, seguido de 1 a 3 l/ha después de la cosecha previo a la caída de hojas. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Citrícos: 3-4 l/ha. Aplicar al inicio del crecimiento de los brotes de otoño y primavera. En casos de deficiencia moderada a severa repetir aplicación 10 a 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 250 l/ha.

Frujillas (en campo): 1-2 l/ha. Aplicar en el crecimiento de

primavera, pudiendo repetir en yemas verdes.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Granado: Aplicar 2 l/ha justo antes del comienzo de caída de hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Maiz: 1-2 l/ha. Aplicar entre 4 a 8 hojas. Para deficiencias moderadas repetir esta aplicación entre 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Manzana: 1 a 2 l/ha en apertura de yemas. Evitar floración. Aplicar 1 l/ha cuando el fruto tiene 2 a 3 cm de diámetro, repetir una o dos veces 10 a 14 días después. Aplicar 1 a 3 l/ha después de la cosecha previo a la caída de hojas.

Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Nogales: Aplicar 1 a 2 l/ha en brotación. Repetir 15 días después si es necesario. Volumen de agua: 500 a 1.000 l/ha

Papas: 1 a 2 l/ha una semana después del 100% de emergencia.

Para deficiencias moderadas a severas, repetir la aplicación en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua: 30 a 250 l/ha.

Perales: 2 l/ha. Aplicar a apertura de yemas. 2-3 l/ha, aplicar después de la cosecha, durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Tomates (en campo): 1-2 l/ha. Aplicar entre 4 y 6 hojas, pudiendo repetir entre 10 y 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Uva de mesa y vinífera: 2-3 l/ha. Aplicar con brotes de 30 cms y repetir 15 días después. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Por favor tener en cuenta que este producto puede dejar un residuo blanco. No aplicar en el plazo de un mes antes de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

SÓLO debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C y >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.