



YaraVita™

Bud Builder™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Bud Builder™

Fertilizante foliar compuesto con P, Mg, B y Zn

Contiene:

7,2% de Fosfato (P_2O_5)

24% de Magnesio (Mg)

3,3% de Boro (B)

11% de Zinc (Zn)

Polvo Mojable

Solubilidad en agua - 18% a 20°C

pH - 8,5 (a 5% en agua)

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 150; Cd ≤ 10; As ≤ 50; Hg ≤ 2

Número de Lote: CLP15W24

Fecha de Fabricación: MM/YYYY



Fecha de Vencimiento: MM/YYYY

Fabricado por **Yara UK Ltd** - Inglaterra

Importado y Distribuido **Yara Chile Fertilizantes Ltda.**

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.

Fono (56-2) : 232 57 12



UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc phosphate)

Peligro

Ingredientes peligrosos: octaborato de disodio tetrahidratado

H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P391: Recoger el vertido. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en según los reglamentos locales.

10Kg

YaraVita™ Bud Builder™

RECOMENDACIONES DE USO

Almendros: 8 a 10 kg/ha en post cosecha, antes de la caída de las hojas. Además, aplicar 5 a 10 kg/ha desde brotación hasta inicio de floración. Volumen mínimo: 500 a 1000 l/ha.

Arándanos: 5 kg/ha antes de la caída de hojas. Repetir aplicación a inicio de brotación en la siguiente temporada. Volumen de agua: 200 l/ha.

Cerezos, Ciruelos, Damascos, Durazneros, Nectarinos: Aplicar de 5 a 10 kg/ha en post cosecha, a partir de un mes antes del inicio de la caída de hojas, repetir si fuese necesario 10 a 14 días después. Aplicar de 5 a 10 kg/ha entre brotación e inicio de floración. Volumen de agua: 500 a 1000 l/ha.

Citrícos: 10 kg/ha aplicado en post cosecha. Aplicar 5-10 kg/ha desde inicio de brotación hasta inicio de floración. No aplicar durante la floración. Volumen de agua: 500 l/ha.

Frambueso: Aplicar 5 kg/ha a partir de yemas verdes antes del inicio de la floración. También aplicar 5 kg/ha en postcosecha antes de la senescencia de las hojas. Volumen de agua 200 a 500 l/ha.

Kiwi: 5 a 10 Kg/ha. Aplicar en pre floración. Repetir en post cosecha, antes del inicio de la caída de las hojas. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Manzanos, Perales: Aplicar de 8 a 10 kg/ha en post cosecha, durante las tres semanas que anteceden al inicio de las caída de las hojas. Aplicar de 5 a 7 kg/ha en puntas verdes. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Nueces (de hoja caída): Nogales, Pecanos, Castaños y Avellanos: 8 a 10 kg/ha en post cosecha antes de la caída de las hojas. Aplicar 5 a 10 kg/ha desde la apertura de las yemas al inicio de floración. Volumen de agua 500 l/ha.

Olivo: aplicar 5 a 10 kg/ha desde inicio de brotación hasta el inicio de floración. Volumen de agua 500 l/ha.

Tomate (en campo): Aplicar 1 a 3 kg/ha en 4 a 6 hojas. Puede ser necesario repetir una o dos veces esta aplicación en intervalos de 10 a 14 días. No aplicar durante floración. Volumen de agua 500 l/ha.

Uva de mesa: Uva vinífera: 5 kg/ha hasta tres veces en pre-floración en intervalos de 10 a 14 días. Aplicar en post cosecha en dosis de 10 kg/ha antes de la caída de hojas. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación, de los Términos y Condiciones de venta.