



**YaraVita**<sup>TM</sup>

Croplift Bio<sup>TM</sup>

# Croplift Bio<sup>TM</sup>

## AVISO

Lea la etiqueta antes de usar este producto

Fertilizante inorgánico para aplicación foliar

Contiene

**10% de Nitrógeno (N)**

**4% de Pentóxido de Fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

**7% de Óxido de Potasio (K<sub>2</sub>O)**

**0,02% de Boro (B)**

**0,1% de Cobre (Cu)**

**0,13% de Manganeseo (Mn)**

**0,003% de Molibdeno (Mo)**

**0,07% de Zinc (Zn)**

Líquido Soluble

Consérvese en un lugar cerrado y fuera del alcance de los niños.

### Presentaciones a comercializar:

100mL, 250mL, 500mL, 1L, 10L, 1000L

No. de registro: 0170-F-AGR-G

H402: Nocivo para los organismos acuáticos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

Titular de registro:

**YARECUADOR CIA LTDA**

Km 1.5 vía Samborondón. Edificio Arcos Plaza II. Piso 4.

Teléfono: +(593) 43 752673

consultasecuador@yara.com

www.yara.com.ec

**Fabricado por:** Yara UK Ltda, York, YO42 1DN, Inglaterra



**1000 litros**  
Peso neto  
1177 kg

**PVP:** \$ 13,000.00

**Nº de Lote:** Ver el paquete para más detalles

**Fecha de Fabricación:** Ver la fecha impresa en el envase.

**Fecha de Caducidad:** 60 meses desde la fecha de fabricación impresa en el envase.

# YaraVita™ Croplift Bio™

Cultivo	Dosis	Época de aplicación	Forma de aplicación
Banano (Musa sp.) Plátano (Musa x paradisiaca)	2 l/ha. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.	Desallorreo vegetativo hasta floración.	Aplicación vía foliar en intervalos de mínimo 30 días para mayor eficacia.
Aroz (Oryza sativa), Maíz (Zea mays), Trigo (Triticum), Cebada (Hordeum vulgare)	1 l/ha. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.	Inicio del macollaje, diferenciación floral y prefloración.	Aplicación vía foliar en intervalos de mínimo 15 días para mayor eficacia hasta prefloración.
Brocoli (Brassica oleracea var. Italica), Coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis), Coles (Brassica oleracea var. Gemmifera)	1 l/ha. Volumen mínimo de agua: 100 l/ha.	En 4 - 9 hojas.	Aplicación vía foliar. En caso de necesidad, repetir en intervalos de 10-14 días a la misma dosis.
Tomate (Solanum lycopersicum), Pimiento (Capsicum annuum), Chile (Capsicum annuum), Papa (Solanum tuberosum)	0,3 l/ha. Volumen de agua mínimo: 100 l/ha.	En 4 - 9 hojas.	Aplicación vía foliar, repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.
Cafetos (Cactaceae)	1 l/ha. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.	Desallorreo vegetativo hasta floración.	Aplicación vía foliar, en caso de necesidad en intervalos de 30 días.
Citrícos (Citrus spp.)	1 l/ha. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.	Desallorreo vegetativo hasta floración.	Aplicación vía foliar, en caso de necesidad repetir en intervalos de 10-14 días a la misma dosis.
Rosas (Rosa spp.)	0,3 l/ha. Volumen mínimo de agua: 400 l/ha.	Después del comienzo del nuevo crecimiento	Aplicación vía foliar, 3 aplicaciones a 8, 15 y 25 días.

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con las condiciones fisiológicas de la planta y condiciones de clima".

**Para mayor información consulte a un técnico profesional**

## INSTRUCCIONES DE USO

### SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

### MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse.

Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

### PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en [www.yara.com](http://www.yara.com).

### ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

### CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Evite el contacto con la piel y/o ojos. Consulte las indicaciones de primeros auxilios. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. No se almacene junto a productos alimenticios. No se reutilice este envase, destruyase. No se deje al alcance de los niños.

