



YaraVita™

Zintrac™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo).

Consultar con el asesor técnico de la zona previo análisis para determinar la carencia a nivel foliar y de suelo.

No pulverizar en horas de gran insolación o alta temperatura.

Prohibido su uso en cultivos de Tabaco.

Zintrac™

Fertilizante Foliar de Zinc
Suspensión concentrada

Inscrito en el SENASA (SAGPYA) bajo el N°: 12.220

Composición Química - total:

70% p/v = 700 g/l Zinc (Zn) (40% p/p)

Origen: INGLATERRA

Fabricante: Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, Inglaterra.

Distribuidor: Yara Argentina SA, Av. Del Libertador 498 Piso 16. -C1001ABR-

Buenos Aires, Argentina

Tel: (011) 51696400 Fax: (011) 51696550

E-mail: info@yara.com.ar Web: www.yara.com.ar



Atención

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.


P391: Recoger el vertido.

UN 3082

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (zinc oxide)

10 litros

Peso neto
17,34 kg



YaraVita™ Zintrac™

DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN

Alfalfa: 0.33 l/ha aplicados al comienzo de la temporada de crecimiento. Repetir 2 a 3 semanas mas tarde a las mismas dosis. Volumen de agua aconsejado: 30 a 200 l/ha.

Algodón: 0.3 a 1 l/ha, 3 a 4 semanas post emergencia. Repetir si es necesario a intervalos de entre 10 a 14 días. Volumen de agua: 50 a 150 l/ha. Para aplicación aérea 0.33 l/ha aplicados 3 a 4 semanas post emergencia. Repetir si es necesario a intervalos de entre 10 a 14 días. Volumen de agua: 20 a 50 l/ha.

Arándano: Sólo para arándano alto (highbush): aplicar 1 l/ha justo antes del comienzo de caída de hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación. Volumen de agua: 200 l/ha.

Arroz: 1 l/ha al inicio del macollaje y al inicio de formación de la panícula. Volumen mínimo de agua: 50 l/ha.

Brócoli: 1 a 2 l/ha en 4-9 hojas. Volumen de agua: 30 a 500 l/ha.

Caña De Azúcar: 1 l/ha cuando la caña mide entre 30 y 120 cm altura. Se puede repetir en caso de necesidad en intervalos de 10-14 días. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

Ciruela, Durazno: 0.5 a 0.75 l/ha en brotes de 10 a 20 cm, más una repetición 15 a 20 días más tarde. Volumen de agua: 200 a 1800 l/ha

Citricos: 1 l/ha en las brotaciones de primavera y de otoño. Se puede repetir a intervalo de 10-14 días en caso de necesidad a la misma dosis Volumen de agua: 500 a 1.000 l/ha.

Cultivos Protegidos/Invernáculos: aplicar 50 cc/100 lts de agua como concentración máxima. Volumen de agua máximo 1000 l/ha. Refiérase a cada cultivo en campo para momentos de aplicación.

Espinaca: 1 l/ha en 4-6 hojas. Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.

Frutilla (A Campo): Una aplicación de 0.5 l/ha en la fase de yemas verdes, seguida de 2 aplicaciones de 0.25 l/ha en la fase del yema blanca y en el rebrote post cosecha. Volumen de agua: 30 a 500 l/ha.

Girasol: 0,6 l/ha a 2 pares de hojas. Volumen de agua: 200 l/ha.

Leguminosas (Porotos, Soja): 0,5 a 1 l/ha cuando las plantas miden entre 5 hasta 15cm. Volumen de agua: 200 l/ha.

Maíz: 0,5-1 l/ha de 3 a 8 hojas. Con deficiencias severas repetir la aplicación 10 a 14 días después. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

Manzanos: Realizar aplicaciones de 1 a 1,5 l/ha en brotación de las yemas. Evitar aplicar durante floración. Se puede repetir a partir de 6 semanas de caída de pétalos en dosis de 0,5 l/ha. Repetir en post cosecha en dosis de 1 a 2 l/ha con hojas activas antes de la caída de las hojas. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Pepino (A Campo): 0.5 l/ha a partir de 4-6 hojas. Puede ser necesario repetir aplicaciones. Volumen de agua: 500 l/ha.

Pimiento (A Campo): 1 l/ha a partir de las 4-6 hojas. Puede ser necesario repetir aplicaciones. Nota: la última aplicación debe hacerse como mínimo un mes antes de la cosecha.

Volumen de agua: 200 a 500 l/ha.

Tomate (A Campo): 0.3 a 1 l/ha en 4-6 hojas. Repetir a intervalos de 10 a 14 días si es necesario. Volumen de agua: 30 a 500 l/ha.

Uva De Mesa: 0,75-1 l/ha en dos aplicaciones a botones florales visibles, botones florales separados o a cuaja.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < and <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.