



YaraVita™

Zintrac™ 700

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Zintrac™ 700

Fertilizante foliar de zinc

Contiene:

70% p/v = 700 g/l de Zinc (Zn)

Floable

Solubilidad en agua - 49% a 20 °C

pH - 9

Densidad 1730 g/L a 20 °C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 20; Cd ≤ 10; As ≤ 10; Hg ≤ 2

Fabricado por **Yara UK Ltd** - Inglaterra

Importado y Distribuido **Yara Chile Fertilizantes Ltda.**

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.


Fono (56-2) : 232 57 12

Atención

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P391: Recoger el vertido.



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Zinc phosphate)

Número de Lote: CLP48M22

Fecha de Fabricación: MM/YYYY

Fecha de Vencimiento: MM/YYYY

10 litros

YaraVita™ Zintrac™ 700

RECOMENDACIONES DE USO

Arándanos: Aplicar 0,5 a 1 l/ha a inicio de brotación y repetir 10 a 14 días después. Aplicar 1 l/ha en post cosecha antes de la caída de hojas. Volumen de agua: 200 l/ha.

Cebolla: 0.25 a 1 l/ha cuando exista suficiente área para interceptar la aspersión. Volumen de agua 30 a 200 l/ha. Cereales: 0,5 a 1 l/ha a partir de 2 hojas hasta primer nudo detectable (Zadok G.5 12 a 31), repetir una o dos veces a intervalos de 10 a 14 días en caso de moderada a severa deficiencia. Volumen de agua 200 l/ha.

Cerezos, Ciruelos, Damascos, Durazno, Nectarino: Aplicar 0,5 l/ha desde fruto cuajado cada 14 días hasta un mes previo a la cosecha. Aplicar 1 a 2 l/ha en post cosecha antes de la senescencia de las hojas. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Citricos: 1- 2 l/ha. Aplicar al inicio de crecimiento de los brotes en primavera y otoño, en caso de deficiencias moderadas a severas repetir aplicación 10 a 14 días después. Aplicar durante el inicio de flush de crecimiento de verano. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Colza/Raps: aplicar 1 a 2 l/ha, con plantas entre 4 a 9 hojas. Volumen de agua: 30 a 500 l/ha.

Granado: Aplicar 1 l/ha en pre-flor, después de floración y durante formación de fruto. Volumen de agua: 1000 l/ha.

Maíz: 0,3-1 l/ha. Aplicar a partir de 3 a 8 hojas, pudiendo repetir entre 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Manzanos: Aplicar 0,75-1 l/ha en puntas verdes. No aplicar durante floración. Repetir en dosis de 0,5 l/ha a partir de 6 semanas después de caída de pétalos o después de frutos de 20 mm de diámetro. En post cosecha aplicar en dosis de 1,5 a 2 l/ha durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas.

Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Olivo: 1 l/ha aplicado en brotación y repetir en apertura del cáliz. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Papas: 1 l/ha. Aplicar una semana después de que ha emergido el 100% del cultivo. Con deficiencias moderadas repetir 10 a 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 50 l/ha.

Uva de Mesa: Uva vinífera: una o dos aplicaciones de 1 l/ha aplicado durante el crecimiento de brotes antes de floración, dejando 7 a 10 días de intervalo entre las aplicaciones. Repita en cuaja si es necesario. También 1 a 2 l/ha después de la cosecha antes de la senescencia de las hojas. Volumen de agua 200 l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C y >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.