



AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Hydromag™ Flow

YaraVita™

Hydromag™ Flow

Fertilizante foliar de magnesio

Contiene:

32% p/v = 320 g/l de Magnesio (Mg)

Floable

Solubilidad en agua - 43% a 20 °C

pH - 11

Densidad 1500g/L a 20 °C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 10; Cd ≤ 5; As ≤ 10; Hg ≤ 2

Mantener fuera del alcance de los niños.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Fabricado por Yara UK Ltd - Inglaterra

Importado y Distribuido Yara Chile Fertilizantes Ltda.

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.

Fono (56-2) : 232 57 12

Número de Lote: CLP58M22

Fecha de Fabricación: MM/YYYY

Fecha de Vencimiento: MM/YYYY

10 litros

YaraVita™ Hydromag™ Flow

RECOMENDACIONES DE USO

Almendra, Nogales, Avellanós: Aplicar 3 a 4 l/ha en brotes de 15 cms. Repetir 10 a 14 días después si es necesario.

Volumen de agua: 500 l/ha.

Arándanos: 4 l/ha, 10 días después que la caída de pétalos haya terminado. En caso de ser necesario, Repetir 10 a 14 días después. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha.

Volumen de agua: 1000 l/ha.

Cereales: 2-4 l/ha. Aplicar a partir de 2 hojas hasta el primer nudo detectable (etapa de Zadok entre 2 a 31). Con deficiencias severas repetir la aplicación entre 10 a 14 días después. Es posible realizar una tercera aplicación en la etapa de hoja bandera hasta antes. Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.

Cerezos, Ciruelos, Damascos, Duraznos, Nectarinos:

3-4 l/ha. Aplicar con frutos cuajados y repetir 10 a 14 días después si es necesario. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Citricos: 4 a 5 l/ha. Aplicar al inicio de crecimiento de brotes de otoño y primavera. Para deficiencias moderadas a severas repetir la aplicación 10 a 14 días después. Con deficiencias severas repetir durante el crecimiento de verano y repetir 20 a 30 días después. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Frutillas (en campo): 3-4 l/ha. Aplicar en yemas verdes, pudiendo repetir entre 10 a 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Granado: aplicar 4 l/ha en pre-flor, después de floración y durante formación de fruto. Volumen de agua: 1000 l/ha.

Kiwi: 2-4 l/ha. Aplicar con brotes de 30 cm y repetir inmediatamente antes de la floración. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha. Manzanos, Perales: 2-4 l/ha. Aplicar hasta botón floral y repetir en caída de pétalos. En variedades susceptibles a russet, aplicar a partir de 6 semanas después la caída de pétalos.

Volumen de agua mínimo: 1.000-1.500 l/ha.

Mai: Aplicar 2 a 4 l/ha con plantas entre 4 a 8 hojas.

Volumen de agua sugerido: 30 a 200 l/ha.

Papas: 4 l/ha. Aplicar una semana después de 100% emergencia. Con deficiencias moderadas repetir la aplicación 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 50 l/ha.

Tomates (en campo): 4 l/ha. Aplicar a partir de 4 a 6 hojas, repetir si es necesario entre 10 a 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Uva de mesa, Uva vinífera: 3-4 l/ha. Comenzar las aplicaciones con brotes de 30 cm y repetir inmediatamente antes de la floración. A partir de frutos cuajados realizar 1 a 3 aplicaciones hasta bayas de 5-7 mm (Uva vinífera hasta tinta), aplicaciones posteriores en uva de mesa podrán dejar un depósito sobre la baya. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Por favor tener en cuenta que este producto puede dejar un residuo blanco. No aplicar en el plazo de un mes antes de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C y >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.