



YaraVita®
Hydromag™



10L

Netomass:
Svoris neto:
Neto masa:
14,98 kg

Hydromag™

EE LT LV

EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Makrotoitaineid sisaldav vedel lihtmineraalväetis
Mg (+36)
Suspensioonkoncentraat

Toiteelementide sisaldused massiprotsentides %
36% (=539 g/l) magneesiumoksiidi kokku (MgO)

Sisaldab ka:
4,6% (=69 g/l) lämmastikku kokku (N) [4,6% urealämmastikku]

Koostis: magneesiumhüdrosiidi brutsiit CAS n° 1309-42-8 (CMC 1: algmaterjalist ained ja segud), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

See väetis sisaldab ureat, mis võib eritada ammoniaaki ja mõjutada õhukvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest ja regulatsioonidest tuleb ette võtta asjakohaseid meetmeid nende mõjude vähendamiseks.

Partii number: vt pakendit Tootmiskuupäev: vt pakendit

Yara Eesti OÜ, Papiniidu 5, 80042 Pärnu www.yara.ee

LT PASTABA

Prieš naudodami šias trąšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Paprastosios skystosios neorganinės makroelementų trąšos
Mg (+36)
Skysta suspensija

Sudėtis, masė %
36% (=539 g/l) bendro magnio oksido (MgO)

Taip pat sudėtyje yra, masė %
4,6% (=69 g/l) bendro azoto (N) [4,6% karbamido azoto]

Sudėtis: magnio hidroksido brucitas CAS n° 1309-42-8 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš gryųjų medžiagų), karbamidaz CAS n° 57-13-6 (SMK 1).

Šiose trąšose yra karbamido, kuris gali išskirti amoniaką ir turėti įtakos oro kokybei. Priemonių reikia imtis atsižvelgiant į vietos sąlygas.

Partijos numeris: Žr. pakuotę Pagaminimo data: Žr. pakuotę

Yara Lietuva UAB Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius www.yara.lt

SOOVITAVAT KASUTAMISMÄÄR JA AJASTAMINE

Kartul: Madala magneesiumi sisaldusega põldudel teha esimene pritsimine normiga 4.0 l/ha üks nädal pärast kartuli 100% tärkamist. Lisaks teha teine pritsimine 4.0 l/ha mugulate täitumisel. Kui magneesiumi sisaldus muldas on vajaliku kogusega, piisab tavaliselt ühest pritsimisest normiga 4.0 l/ha mugulate täitumise algfaasis. Vajadusel ja puudusilmingute tellimisel (või analüügi tulemuste põhjal) teha teine pritsimine 10-14 päevase intervalliga. Vee kogus 150-200 l/ha.

Raps: Ühekordset kasutamisel 2.0-4.0 l/ha rapsi varre pikkuskasvu algfaasis (BBCH 31-32). Mõõduka kuni raske magneesiumi puuduse korral pritsida rapsi normiga 4.0 l/ha kevadel 4.-6. lehe faasis, pluss 2.0-4.0 l/ha varre pikkuskasvu algfaasis. Vee kogus 150-200 l/ha.

Teravili: Ühekordset kasutamisel 2.0-4.0 l/ha 2. lehe faasist kuni esimese kõrresõlme tuvastamiseni (BBCH 12-31). Mõõduka kuni raske magneesiumi puuduse korral korrata pritsimist 10-14 päeva pärast. Nisu kvaliteedi tõstmiseks pritsida lipulehe staadiumist kuni õitsemise alguseni normiga 2.0-4.0 l/ha (BBCH 39-61). Vee kogus 150-200 l/ha.

KASUTAMISJUHEND**JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID**

Enne kasutamist segage toode põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidades rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagiseguse kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasvatja vastutuses. Enne paagisegu tegemist külastage otulis teabe saamiseks kindlasti veebilehte www.tankmix.com või küsige täiendavat infot Yara lt.

ETTEVAATUSABINÕUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimuste korral, näiteks pöud, väga niiske ilmastik, öökülm, vihm või kui on oodatava öökülma või vihma. Tooted käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja nõukaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimuste eest (vältida temperatuur alla 0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Tootte kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

IETEICAMIE LIETOŠANAS DAUDZUMS UN LAIKS

Graudaugi: 2-4 l/ha sākot no 2 lapu stadijas līdz pirmajam mezglam (AS 12-31). Vidēja līdz smaga Mg trūkuma gadījumā atkārt pēc 10 līdz 14 dienām. Pārtikas kvalitātes kviešiem 2-4 l/ha sākot no karoglapas parādīšanās brīža līdz ziedēšanas beigām (AS 39-69). Ūdens daudzums: 200 l/ha.

Kartupeļi: Vienreizēja smidzinājuma gadījumā 4 l/ha kartupeļu bumbuļu brīešanas laikā. Vidēja vai nopietna Mg trūkuma gadījumā 4 l/ha vienu nedēļu pēc 100 % kartupeļu sadīgšanas. Atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200 l/ha.

Rapsis: Vienreizējs smidzinājums stublāja veidošanās sākumā 2-4 l/ha (AS 30-39). Vidēja vai nopietna Mg trūkuma gadījumā 2-4 l/ha sākot no 4-8 lapu attīstības stadijas (AS 14-19). Atkārtot pēc 10-14 dienām. Nesmidzināt ziedēšanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**VIENMĒR IEVĒROJIET ETIKĒTĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS**

Rūpīgi sakratiet produktu kannu pirms lietošanas. Pārliecinieties, vai smidzinātājs un tā pārejīe mezglī ir tīri un pareizi noregulēti. Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bāzē, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produktos pilnībā izšķīdis. Pieplidiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

BĀKAS MAISIJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet www.tankmix.com un ļauj pārbaudīt bākas maisījuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētām padomam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādē. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels saussims, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krāsām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C). Izlietoto iepakojumu utīlējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standartā pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.

TIKAI PROFESIONĀLIEM LIETOTĀJIEM.

Lai iegūtu precīzus ieteikumus, sazinieties ar vietējo Yara pārstāvi. www.yara.lv

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Graudaugi: 2-4 l/ha sākot no 2 lapu stadijas līdz pirmajam mežglam (AS 12-31). Vidēja līdz nopietna Mg trūkuma gadījumā atkārt pēc 10 līdz 14 dienām. Pārtikas kvalitātes kviešiem 2- 4 l/ha sākot no karoglapas parādīšanās brīža līdz ziedēšanas beigām (AS 39-69). Ūdens daudzums: 200 l/ha.

Kartupeļi: Vienreizēja smidzinājuma gadījumā 4 l/ha kartupeļu bumbuļu briešanas laikā. Vidēja vai nopietna Mg trūkuma gadījumā 4 l/ha vienu nedēļu pēc 100 % kartupeļu sadīgšanas. Atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200 l/ha.

Rapsis: Vienreizējs smidzinājums stublāja veidošanās sākumā 2-4 l/ha (AS 30-39). Vidēja vai nopietna Mg trūkuma gadījumā 2-4 l/ha sākot no 4-8 lapu attīstības stadijas (AS 14-19). Atkārtot pēc 10-14 dienām. Nesmidzināt ziedēšanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.



Lai iegūtu papildu padomus un informāciju par produktu, lūdzu, skenējiet, izmantojot viedtālruni

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**VIENMĒR IEVĒROJIET ETIĶETĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS**

Rūpīgi sakratiet podukta kannu pirms lietošanas. Pārliecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezglī ir tīri un pareizi noregulēti. Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bākā, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produkts pilnībā izšķīdis. Piepildiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

BĀKAS MAISĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet www.tankmix.com, lai pārbaudītu bākas maisījuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētam padomam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairieties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet MSDS, kas pieejama www.yara.com.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (<-5°C un <35°C). Izlieto to iepakojumu utilizējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Bulvės: Dirvožemiuose, turinčiuose mažai magnio, naudoti vieną kartą 4 l/ha praėjus savaitei po 100% sudygimo. Antrą kartą naudoti 4 l/ha gumbų formavimosi metu. Dirvožemiuose, turinčiuose pakankamai magnio, naudoti 4 l/ha gumbų formavimosi pradžioje. Esant poreikiui, kartoti purškimą kas 10-14 dienų. Vandens norma: 150-200 l/ha.

Javai: 2-4 l/ha nuo 2 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo (BBCH 12-31). Norint išvengti maistinių medžiagų trūkumo, kartoti purškimą kas 10-14 dienų. Norint pagerinti derliaus kokybę naudoti 2-4 l/ha nuo vėliavinio lapo pasirodymo iki varpos žydėjimo pradžios (BBCH 39-61). Vandens norma: 150-200 l/ha.

Rapsai: Naudoti vieną kartą 2-4 l/ha stiebo ilgėjimo pradžioje (BBCH 31-32). Esant magnio trūkumui pavasarį, naudoti 4 l/ha 4-6 lapelių tarpsnyje ir 2-4 l/ha stiebo ilgėjimo pradžioje. Nenaudoti žydėjimo metu. Vandens norma: 150-200 l/ha.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMŲ**

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvu rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Pripildykite purkštuvu talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkšti.

PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĚŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tiktai galutinis vartotojas yra atsakingas už produktų maišymą ir trėšimą. Prieš produktų naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti www.tankmix.com svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netrėškite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietui arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

LAIKYMAS

Laikykite vėsiam, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinų sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

