



AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Mantrac™ Pro

YaraVita™

Mantrac™ Pro

Fertilizante foliar de Manganeseo

Contiene:

50% p/v = 500 g/l de Manganeseo (Mn)

Floable

Solubilidad en agua - 38% a 20 °C

pH - 9,5

Densidad 1830 g/L a 20 °C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 50; Cd ≤ 25; As ≤ 20; Hg ≤ 2

Fabricado por **Yara UK Ltd** - Inglaterra

Importado y Distribuido **Yara Chile Fertilizantes Ltda.**

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.

Fono (56-2) : 232 57 12

Número de Lote: CLP75M22

Fecha de Fabricación: MM/YYYY

Fecha de Vencimiento: MM/YYYY

10 litros

YaraVita™ Mantrac™ Pro

RECOMENDACIONES DE USO

Arándanos: 2 l/Ha a caída de pétalos.

Volumen de agua: 200 l/Ha

Cereales: 1 l/Ha desde 2 hojas hasta el primer nudo.

Cuando haya necesidad repetir con intervalos de 10-14 días. Aplicar con 200 l/Ha de agua.

Cítricos (Naranjos, mandarinos y limoneros): 1,25 a 1,5 l/Ha en la brotación de primavera y de verano.

Volumen de agua: 500 a 1.000 l/Ha.

Duraznos, Cerezos, Ciruelos, Damascos y Nectarines: 1l /Ha a partir fruto cuajado. Se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días si necesario. También en post-cosecha, 1 l/Ha, antes del inicio de la caída de las hojas. Volumen de agua: 200 a 1.000 l/Ha.

Maíz: aplicar 1 a 2 l/ha entre 2 a 8 hojas. Para deficiencias moderadas repetir 7 a 14 días después.

Volumen de agua 30 a 200 l/ha.

Manzana y Peral: 1 l/Ha a la caída de pétalos en 500 hasta 1.000 l/Ha agua. Se puede repetir con intervalo de 10-14 días o en caso de grave necesidad aplicar a la misma dosis incluso antes de la floración. En variedades susceptibles a russeting hay que desplazar aplicaciones hasta 6 semanas después de la floración.

Nogal (caduco): Aplicar 1 a 2 l/ha 7 a 14 días después de la caída de pétalos. Volumen de agua: 500 l/ha.

Olivo: Aplicar 1 l/Ha al principio de la temporada. Repetir aplicaciones en intervalos de 10 días si es necesario. Evitar floración. Volumen de agua: 1000 l/ha.

Vid: 1 l/Ha a racimos visibles, botones florales separados y fruto cuajado, en 500 a 1.000 l/Ha agua.

Por favor tener en cuenta que este producto puede dejar un residuo blanco. No aplicar en el plazo de un mes antes de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C y >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.