



**YaraVita™**  
Frutrel™

## AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

# Frutrel™

Mezcla de fertilizante NP con calcio, magnesio, zinc y boro.

Contiene:

**6,9% p/v = 69 g/l de Nitrógeno (N)**

**23% p/v = 230 g/l de Fosfato (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

**20% p/v = 200 g/l de Calcio (Ca)**

**5,8% p/v = 58 g/l de Magnesio (Mg)**

**2% p/v = 20 g/l de Boro (B)**

**4% p/v = 40 g/l de Zinc (Zn)**

Floable

Solubilidad en agua - 47% a 20° C

pH - 9,5

Densidad 1595 g/L a 20° C

Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg):

Pb ≤ 50; Cd ≤ 12; As ≤ 20; Hg ≤ 2

Fabricado por **Yara UK Ltd** - Inglaterra

Importado y Distribuido **Yara Chile Fertilizantes Ltda.**

Av. Pedro de Valdivia 1215 of. 404 - Providencia - Santiago.

Fono (56-2) : 232 57 12

### Atención

Ingredientes peligrosos: óxido de zinc y boro, hidrato

H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o

dañar el feto. H412: Nocivo para los organismos

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P202: No

manipular la sustancia antes de haber leído y

comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de

protección. P273: Evitar su liberación al medio

ambiente. P308+P313: EN CASO DE exposición

manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501:

Eliminar el contenido/el recipiente en según los

reglamentos locales.



**Número de Lote: CLPABM22**

**Fecha de Fabricación: MM/YYYY**

**Fecha de Vencimiento: MM/YYYY**

10 litros

# YaraVita™ Futral™

## RECOMENDACIONES DE USO

**Arándanos:** Aplicar 4 a 5 l/ha al inicio del crecimiento de los brotes, pudiendo repetirse dos veces a intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

**Cerezo, Ciruelo, Duraznos, Nectarinos:** Dos aplicaciones a 5-7,5 l/ha entre brotación de las yemas y el inicio de floración. Además entre 2 a 5 aplicaciones a 5-7,5 l/ha desde cuaja en intervalos de 10-14 días. Evitar aplicar dentro del último mes antes de la cosecha. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

**Damascos:** Dos aplicaciones de 4 a 5 l/ha entre brotación de las yemas y el inicio de floración. Además entre 2 a 5 aplicaciones de 4 a 5 l/ha desde cuaja en intervalos de 10-14 días. Evitar aplicar dentro del último mes antes de la cosecha.

Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

**Kiwi:** Aplicar en dosis de 4 a 5 l/ha cuando las primeras hojas estén completamente desarrolladas, en caída de pétalos y repetirse 2 veces más a intervalos de 10 a 14 días. Nota: aplicar hasta frutos de 25 mm.

Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

**Manzano, Perales:** aplicar 4 a 5 l/ha en brotación. También aplicar 2 a 5 veces en dosis de 4-5 l/ha, a intervalos de 10 a 14 días, a partir de frutos de 20 mm en adelante. No aplicar durante los 30 días que anteceden al inicio de la cosecha.

Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

**Nueces (de hoja caída): Nogales, Castaños y Avellanos:** Realizar 3 aplicaciones en dosis de 3 a 5 lt/ha en prefloración, repitiendo al final de floración y 15 días después. Volumen de agua 500 l/ha.

**Uva de mesa, Uva vinífera:** Realizar 3 aplicaciones a 2,5 hasta 5 l/ha a partir de inicio de floración en intervalos de 10 a 14 días. No aplicar con frutos de más de 5 mm. Volumen de agua: 200 l/ha. obs: Aplicaciones tardías pueden dejar residuos en el cultivo. No aplicar con fruto mayor a 5 mm de diámetro.

**Por favor tener en cuenta que este producto puede dejar un residuo blanco. No aplicar en el plazo de un mes antes de la cosecha.**

## INSTRUCCIONES DE USO

### SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

## MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

## PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en [www.yara.com](http://www.yara.com).

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

## CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.