



AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.

Potash Advance™

YaraVita™

Potash Advance™

Fertilizante foliar de potasio

Contiene:

50% p/v (500g/l) Óxido de potasio (K₂O)

Líquido Soluble

Origen: INGLATERRA

Fabricante: Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, Inglaterra.

Importado y Distribuidor por: **Yara Perú S.R.L**

Dirección: Jr. Monterrosa Nro. 271 Dpto. 902 Santiago de Surco Lima

Teléfono: (511) 7432641

10 litros



YaraVita™ Potash Advance™

DOSIS Y EPOCA DE APLICACION

Cereales: 5 l/ha desde mitad del macollaje hasta el segundo nudo (Zadoks G.S. 25 a 32). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad. Volumen de agua: 200 l/ha. Aplicación vía aérea: 3 l/ha desde mitad del macollaje hasta el segundo nudo (Zadoks G.S. 25 a 32). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.

Volumen de agua: 20 a 50 l/ha.

Cucurbitáceas en campo (Sandías/melones/zapallo/zapallo italiano): 3 a 5 l/ha en intervalos de 10 días desde el inicio del desarrollo de la primera fruta. Volumen de agua: 500 l/ha.

Durazneros: 3 aplicaciones de 3 a 5 l/ha a partir de endurecimiento de carozo, repitiendo con intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Espárragos : 3 a 5 l/ha antes de la senectud de las hojas. Volumen de agua: 200 l/ha.

Frutillas (en campo): 5 l/ha después de la floración, repetir si es necesario en intervalos de 7 a 10 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Hortalizas de hojas (en campo): 5 l/ha a 20 días después la 4 a 6 hojas. Se puede repetir si necesario en intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha. Volumen de agua: 500 l/ha.

Mango: 2 l/ha en crecimiento de frutos aplicar 1 a 3 veces, en intervalos de 14 a 21 días, según necesidad. Volumen de agua: 500 to 1000 l/ha. No se aplica dentro de 10 días después de una aplicación de aceite mineral.

Manzano, Peral: 1 a 2 aplicaciones de 2 a 3 l/ha comenzando a partir de frutos de 20 mm con intervalos de 10 a 14 días. Las aplicaciones posteriores pueden ser realizadas en dosis de 5 l por ha. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Cebolla: 5 l/ha tan pronto exista un área foliar suficiente como para recibir la aspersión. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Palto: 3 l/ha en crecimiento de frutos aplicar 1 a 3 veces, en intervalos de 10 a 14 días, según necesidad. Volumen de agua: 500 to 1000 l/ha.

Pimentones (en campo): realizar 1 a 4 aplicaciones a intervalos de 10 a 14 días, en dosis de 5 l/ha, a partir del cuajado del fruto de la segunda emisión de flores.

Volumen de agua 50 a 500 l/ha.

Tomates (en campo): 3 l/ha aplicado después de la cuaja del primer racimo pudiendo repetir a intervalos de 10 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Uva de Mesa: Uva Vinífera: 3 a 5 l/ha a partir de brotes de 30 cms hasta antes de floración, es posible repetir dentro de estos estados en intervalos de 10 a 14 días. Repetir en frutos cuajados, bayas tamaño arveja e inicio de pinta.

Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Los productos YaraVita™ se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

INSTRUCCIONES DE USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACION

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C and >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.