

칼슘(CaO)	17%
밀도	1.327kg/L
pH	9.8
색상	녹색

노지작물	시비법 (엽면시비용)		
감자	감자형성기: 5~10L/ha (10~14일 간격으로 2~3회 시비)		
딸기	개화기: 10L/ha (7~10일 간격으로 3회 시비)		
배	착과기: 5~10L/ha (수확 1주 전까지 7~14일 간격으로 반복)		
사과	발아기: 2~5L/ha (개화 전까지 7~10일 간격으로 반복) 착과기: 5~10L/ha (수확 1주 전까지 7~14일 간격으로 반복)		
양파, 마늘	비대기: 5L/ha (10~14일 간격으로 반복)		
엽채류	5L/ha (정식 10~14일 이후부터 10~14일 간격으로 2~3회 반복)		
대파, 쪽파	5L/ha (정식 15~20일 이후부터 10~14일 간격으로 반복)		
핵과류	수확 4주 전, 수확 2주전: 각 5~10L/ha		

시설작물/시비시기	4-6엽기~2화방	2화방~8화방	8화방~수확 종료
토마토 (엽면시비용)	300~500배 (1L당 2~3동 사용)	800~1000배 (1L당 4~5동 사용)	800~1000배 (1L당 4~5동 사용)
	5~7일 간격	7~10일 간격	7~10일 간격

시설작물/시비시기	2-3엽기~러너발생	1화방~3화방	3화방~수확 종료
딸기 (엽면시비용)	300~500배 (1L당 2~3동 사용)	800~1000배 (1L당 4~5동 사용)	500~800배 (1L당 3~4동 사용)
	5~7일 간격	7~10일 간격	5~7일 간격

반드시 용법 대로 사용하십시오.

저장
서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 어린이의 손에 닿지 않는 안전한 장소에 보관하십시오. 저온(영하), 고온(40°C 이상) 혹은 급격한 온도변화를 피하십시오. 사용한 용기는 규정에 맞게 재활용하십시오.

판매 약관
본 제품은 판매자의 판매 약관에 따라 판매되며, 제품의 사용은 구매자의 판매 약관 동의에 의해 이루어집니다.



YaraVita™ Stopit™ 스타핏

액상석회(엽면시비용)



팁번, 끝색음, 배꼽색음 등 칼슘 결핍 증상 완화
스트레스 내성 증가 및 저장성 증가
과색 향상 및 수확량 증가

사용시 주의사항

항상 본 라벨의 지침을 따르십시오. 사용 전 제품을 잘 섞어주십시오. 제품 혼용 시 물탱크에 천천히 부어주십시오. 엽면시비 중 성분의 균일성을 유지하기 위하여 교반기 혹은 기포발생기를 사용하는 것을 권장합니다.

급격한 온·습도 변화, 서리, 비 등의 환경은 피해주십시오. 제품 사용 시 올바른 보호 장구를 착용하십시오. 모든 보호 장구는 사용 전, 후로 철저히 유지하십시오.

위험

염화칼슘 함유
H319: 안구 손상 유발 가능
P280: 보안경 권장
P264: 제품사용 후 손 씻기
P305 + 351 + 338: 눈에 들어갔을 경우 몇 분간 흐르는 물로 씻어낸 후 의사와 상담하세요. 콘택트렌즈 착용 시, 렌즈를 제거하는 것이 가능하다면 먼저 렌즈를 제거해주세요.
P337 + 313: 눈에 자극이 있으면 즉시 의사와 상담하세요.



비료 수입업자 보증표(Stopit)

- 1.
2. 비료의 종류 및 명칭 : 액상석회(엽면시비용) / 비타 스타핏
3. 실중량 : 1.327kg(1리터)
4. 보증성분량 : 수용성석회 17%
5. 수입년월일 : 별도표기
6. 원산지 : 영국

1 리터