

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIONES

En caso de exposición accidental, lavarse con abundante agua. Aunque el producto no representa un alto riesgo de intoxicación, cuando se maneje en mezcla con agroquímicos en general, se recomienda usar guantes, overol y máscara y atender las recomendaciones del agroquímico con que se mezcla.

El producto puede manchar la ropa.

Lave todo el equipo antes y después de su uso. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

MEDIDAS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de nutrientes vegetales o envases vacíos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

No almacene el producto a la luz directa del sol, en acero galvanizado o en canecas metálicas por períodos prolongados. Utilice mangueras y válvulas no metálicas.

Debe guardarse en su empaque original en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.

Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el enjuague en la mezcla de la aplicación, luego destrúyalo.

Procurar un almacenaje entre 35°C y 0°C para preservar la integridad del producto

CropLift es un Fertilizante de uso foliar. De alto contenido en nitrógeno, fósforo y potasio y elementos menores. Optimiza e incrementa los procesos de crecimiento y desarrollo. Está listo para aplicar, ya que contiene todos los coadyuvantes necesarios para una efectiva acción. La aplicación de **CropLift** aporta al llenado de fruto y el aumento en el rendimiento de la cosecha.

Aprobación etiquetado ICA: 12 Septiembre 2016

CULTIVO	DOSIS*	EPOCA DE APLICACIÓN
Tomate	4,0 l/ha	Primera Aplicación en la etapa inicial del cultivo entre los 20 y 25 días después de trasplante (DDT), Segunda aplicación 40 DDT, tercera aplicación 55 DDT
Maíz	4,0 l/ha	Primera aplicación 20 días después de germinado (DDG), segunda aplicación 30 DDG Tercera aplicación 45 DDG.
Papa	4,0 l/ha	Primera aplicación antes del inicio de la floración a los 30 DDG, segunda aplicación 45 DDG y tercera aplicación a los 60 DDG.

*Volumen de Agua a utilizar 200 litros/ha para tomate y maíz-400 litros/ha papa

Para uso en otros cultivos, las dosis y épocas de aplicación de este fertilizante deben hacerse por recomendación de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar.

*Este fertilizante es un complemento no un sustituto de la fertilización edáfica"

" Agitar el envase fuertemente antes de usar el producto"

COMPATIBILIDAD

Para sus aplicaciones se recomienda hacer antes una prueba para establecer la compatibilidad física de los productos. Lea las instrucciones de uso de las etiquetas y cumpla con las instrucciones. Antes de realizar mezclas consulte con el Ing. agrónomo de Yara y visite www.tankmix.com como una guía para conocer la compatibilidad.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.

LOTE NO: xxxxx
FECHA DE FABRICACION: xx/xx/xxxx
FECHA DE VENCIMIENTO: xx/xx/xxxx