

YaraVita Bortrac 150

DOSES ET STADES D'APPLICATION

Abricotiers, Cerisiers, Nectariniers, Pêchers, Pruniers: Automne: 2-3 l/ha juste après cueillette avant sénescence des feuilles pour la mise en réserve. Volume d'eau: 500-1.000 l/ha. Printemps: 2 l/ha à la séparation des boutons (avant floraison) suivi de 2 apports de 2 l/ha à la chute des pétales (G) et tous les 7-14 jours.

Volume d'eau: 500-1.000 l/ha.

Agurmes: 2-3 l/ha avant floraison. Volume d'eau: 500 l/ha minimum

Asperges: 3 l/ha en foliaire avant la sénescence.

Volume d'eau: 200 l/ha.

Beterraves, Brocoli, Choux-fleurs, Choux: 3 l/ha au stade 4-6

feuilles. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

Colza: 3 l/ha au stade reprise de la végétation au printemps. En cas de carence moyenne ou sévère faire une application au stade 4-6 feuilles. Volume d'eau: 200 l/ha.

Fraisiers (Plein Champ): 2 applications à 1 l/ha au stade boutons blancs et 10-15 jours après. Volume d'eau: 200-500 l/ha.

Haricots (Plein Champ), Pois, Soja: 2 l/ha au stade 10-15 cm.

Volume d'eau: 200 l/ha. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

Légumineuses (Luzerne/Alfalfa): 2 l/ha au stade 10-15 cm. Volume d'eau: 200 l/ha. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

Maïs: 3 l/ha au stade 4-8 feuilles. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

Volume d'eau: 200 l/ha.

Poireaux: 3 l/ha 2 semaines après le repiquage. Volume d'eau: 200 l/ha. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

Poiriers, Pommiers: Automne: 2-3 l/ha juste après cueillette avant sénescence des feuilles pour la mise en réserve. Volume d'eau: 500-1.000 l/ha. Printemps: 2 x 2 l/ha aux stades boutons roses (E, E2) ou début floraison (F) et à la chute des pétales (G, H).

Volume d'eau: 500-1.000 l/ha.

Pommes De Terre: 2 applications de 2 l/ha à 10-15 jours d'intervalle à partir d'une semaine après la levée complète et/ou pendant le grossissement suite à l'analyse pétiolaire.

Volume d'eau: 200 l/ha.

Tomates (Plein Champ): 2 l/ha au stade 4-6 feuilles. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

Tournesol: 2-3 l/ha au stade 4-6 feuilles. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

Volume d'eau: 200 l/ha.

Vignes: 1-1,5 l/ha aux stades grappes séparées (G), boutons floraux séparés (H) et nouaison (I). Volume d'eau: 200-500 l/ha.

CULTURES SOUS ABRI

0,05 litre pour 100 litres d'eau maximum. Volume d'eau: 1.000 l/ha maximum. Se référer à la culture "plein champ" correspondante pour le stade d'application.

MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ÉTIQUETTE

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION

Lire attentivement toutes les étiquettes et se conformer au mode d'emploi ainsi qu'aux recommandations sur les produits devant être co-appliqués ou non. Certains paramètres, extérieurs au contrôle de Yara, peuvent avoir des répercussions sur les performances des produits co-appliqués. Par conséquent, la co-application est réalisée aux risques et périls de l'utilisateur final. Il est fortement recommandé d'effectuer tout d'abord une application limitée en cas d'utilisation de mélanges de produits inhabituels. *Avant la co-application de produits, consultez le site www.tankmix.com/afin d'obtenir des informations. Vous avez également la possibilité de contacter Yara pour obtenir des conseils.*

PRÉCAUTIONS

Produit devant être utilisé uniquement sur des cultures figurant sur la liste. Pour des produits recommandés pour application foliaire, ne pas appliquer sur cultures sous abri à moins que l'application pour cultures sous abri soit sur la liste. Évitez l'application dans des conditions climatiques extrêmes, par exemple en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont attendues. Portez des gants ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et sec, en dehors de la portée des enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures supérieures à 40 °C).

CONDITIONS DE VENTE – GARANTIE LIMITEE ET LIMITES DE RESPONSABILITE

Yara garantit le fait que le produit, dans son conteneur fermé, est conforme à la description figurant sur cette étiquette. Les instructions figurant sur cette étiquette doivent être suivies à la lettre. Elles se basent sur des tests et représentent des données fiables. Les conditions climatiques, l'état du sol et les conditions d'utilisation de ce produit se trouvent en dehors du contrôle de Yara. Par conséquent, il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, sur les effets de l'utilisation de ce produit ou sur les résultats obtenus. En aucun cas la responsabilité de Yara ne peut être estimée à une somme supérieure au prix du produit utilisé. L'acheteur doit assumer les risques liés au stockage, à l'utilisation et à l'application de ce produit. Les marchandises sont vendues sous réserve des conditions de vente de Yara. Celles-ci sont disponibles sur demande. L'utilisation des produits implique que l'acheteur accepte ces conditions de vente.