

# Mantrac Pro

## DOSES ET STADES D'APPLICATION

**Aubergine (Plein Champ):** 1 l/ha dans 200 litres d'eau au stades 4-6 feuilles vraies.

**Agrumes:** 1-2 l/ha avant floraison et à l'automne.  
Volume d'eau: 500 l/ha minimum.

**Berteraves:** 1 l/ha au stade 4-6 feuilles. Volume d'eau: 200 l/ha. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

**Brocolis, Choux-fleurs, Choux:** 1 l/ha dans 200 l d'eau minimum au stade 4-6 feuilles vraies. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

**Carottes:** 1 l/ha au stade 15 cm. Volume d'eau: 200 l/ha. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

**Céréales:** 1-2 l/ha au stade début tallage jusqu'au stade premier noeud discernable. En cas de carences sévères une application supplémentaire peut être réalisée 10-15 jours plus tard.

**Choux De Bruxelles:** Jusqu'à 1 l/ha dans 200 l d'eau au stade 4-6 feuilles vraies.

**Colza:** 1 l/ha au stade 4-6 feuilles jusqu'au stade reprise de la végétation au printemps. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.  
Volume d'eau: 200 l/ha.

**Courgettes, Crucifères (Plein Champ):** Jusqu'à 1 l/ha dans 200 l d'eau au stade 4-6 feuilles vraies.

**Pêchers, Pruniers:** 1 l/ha au stade nouaison. Volume d'eau: 500-1.000 l/ha. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

**Pois:** 1 l/ha au stade 4-6 feuilles en cas de carence. Contre le 'Marsh Spot' (brunissement interne des pois) 2 applications de 1 l/ha aux stades début et fin floraison. Volume d'eau: 200 l/ha.

**Pommes De Terre:** 1 l/ha 1 à 4 semaines après la levée. Volume d'eau: 200 l/ha. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application à 10-15 jours d'intervalle.

**Pommiers:** 1 l/ha avant floraison. En cas de carence moyenne ou sévère répéter l'application après la chute des pétales. Sur variétés sensibles au russetting retarder les applications jusqu'à 6 semaines après la floraison. Volume d'eau: 500-1.000 l/ha. Coloration verte de fond sur Pommes (Jonagold, Elstar, Cox, Golden Delicious): Prévoir 6 applications de 0,25 l/ha à 10-15 jours d'intervalle. Commencer les applications au stade basculement (chute physiologique) et terminer un mois avant la cueillette. Granny Smith: Augmenter la dose à 0,75 l/ha par application. Volume d'eau: 300-1.000 l/ha.

**Soja:** 1 l/ha au stade 4-6 feuilles. Volume d'eau: 200 l/ha.

**Vignes:** 1 l/ha dans 500 litres d'eau minimum aux stades grappes visibles, boutons floraux séparés et nouaison.

## CULTURES SOUS ABRI

0,05 litre pour 100 litres d'eau maximum.

Volume d'eau: 1.000 l/ha maximum. Se référer à la culture "plein champ" correspondante pour le stade d'application. Ne pas appliquer moins d'un mois avant la récolte.

## MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ÉTIQUETTE

*Secouer le bidon* et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

## MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION

Lire attentivement toutes les étiquettes et se conformer au mode d'emploi ainsi qu'aux recommandations sur les produits devant être co-appliqués ou non. Certains paramètres, extérieurs au contrôle de Yara, peuvent avoir des répercussions sur les performances des produits co-appliqués. Par conséquent, la co-application est réalisée aux risques et périls de l'utilisateur final. Il est fortement recommandé d'effectuer tout d'abord une application limitée en cas d'utilisation de mélanges de produits inhabituels. *Avant la co-application de produits, consultez le site [www.tankmix.com/afin](http://www.tankmix.com/afin) d'obtenir des informations. Vous avez également la possibilité de contacter Yara pour obtenir des conseils.*

## PRÉCAUTIONS

*Produit devant être utilisé uniquement sur des cultures figurant sur la liste. Pour des produits recommandés pour application foliaire, ne pas appliquer sur cultures sous abri à moins que l'application pour cultures sous abri soit sur la liste.* Evitez l'application dans des conditions climatiques extrêmes, par exemple en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont attendues. Portez des gants ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

## STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et sec, en dehors de la portée des enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures supérieures à 40 °C).

## CONDITIONS DE VENTE – GARANTIE LIMITEE ET LIMITES DE RESPONSABILITE

Yara garantit le fait que le produit, dans son conteneur fermé, est conforme à la description figurant sur cette étiquette. Les instructions figurant sur cette étiquette doivent être suivies à la lettre. Elles se basent sur des tests et représentent des données fiables. Les conditions climatiques, l'état du sol et les conditions d'utilisation de ce produit se trouvent en dehors du contrôle de Yara. Par conséquent, il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, sur les effets de l'utilisation de ce produit ou sur les résultats obtenus. En aucun cas la responsabilité de Yara ne peut être estimée à une somme supérieure au prix du produit utilisé. L'acheteur doit assumer les risques liés au stockage, à l'utilisation et à l'application de ce produit. Les marchandises sont vendues sous réserve des conditions de vente de Yara. Celles-ci sont disponibles sur demande. L'utilisation des produits implique que l'acheteur accepte ces conditions de vente.