



YaraVita™
Zintrac®700

Zintrac®700

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták

KFV 1(C)(II)(a) Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami
Kapalná suspenze

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%):
40,9% (= 709 g/l) Zinek (Zn) jako oxid, celk

Rovněž obsahuje:
1% (= 17 g/l) Celkový dusík (N) [1% močovinový dusík]

Stožení: Oxid zinečnatý CAS n° 1314-13-2 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), monoethylenglykol CAS n° 107-21-1 (KSM 1).

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00
Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com www.yaraagri.cz

SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták

PFC 1(C)(III)(a) Jednosložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny
Kvapalná suspenzia

Obsah % hmotnosti:
40,9% (=709 g/l) Zinok (Zn) ako oxid, celk

Tiež obsahuje % hmotnosť/hmotnosť:
1% (=17 g/l) Celkový dusík (N) [1% močovínový dusík]

Zloženie: Oxid zinočnatý CAS n° 1314-13-2 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi), monoethylenglykol CAS n° 107-21-1 (CMC 1),

Používať len v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať doporučené dávkovanie. Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá uvoľňuje čpavok a môže mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti na miestnych podmienkach je treba vykonať vhodné sanačné opatrenia.

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00
Tel: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

Distribútor: **LEGUSEM p.t., a.s.**, Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, Slovenská republika. Tel: ++421 32 777 38 58

5 L

Čistá hmotnosť:
8,67 kg

YaraVita™ Zintrac®700

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Obiloviny: 0,5 l/ha od stádia 2 listů do doby nahmatání 2. Kolénka (Zadok's G.5 12 to 31), v případě středního až velkého deficitu opakovat jednou až dvakrát v intervalu 10 až 14 dní. Dávka vody: 50 až 200 l/ha. U ozimů je velmi výhodná aplikace před zimní dormancií.

Jabloně, Hrušně: 1 l/ha ve stádiu květních pupou a na konci kvetení *. Neaplikovat v době kvetení. Lze aplikovat 1 l/ha po sklizni dokud je listová plocha aktivní.

Dávka vody: 200 až 1.000 l/ha.

* U odrůd citlivých na rzivost aplikujte 6 týdnů po odkvětu.

Kukuřice: 0,3- 1 l/ha ve stádiu od 3 do 8 listů. V případě silného deficitu opakovat stejnou dávku po 10 až 14 dnech.

Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

Miák: 0,3-0,5 l/ha ve fázi od 6 do 8 listů.

Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

Třešně, Slivoně, Meruňky, Broskve: Aplikace 1 l/ha ve fázi růžového/bílého poupěte. Aplikace 1l/ha na podzim dokud je listová plocha aktivní. Dávka vody: 500 až 1000 l/ha.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ

Při zapnutí měšičky propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutí měšičky.

TANK MIX / KOMBINACE

Přečtěte si pozorně VSECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit

www.tankmix.com pro důležité informace. Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.yara.com.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémními (-5°C < a <35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Obiloviny: 0,5 l/ha od stádia 2 listov do nahmatania 2. kolienka (Zadok's G.5 12 až 31), v prípade stredného až veľkého deficitu opakovat jeden až dvakrát v intervale 10 až 14 dní. Dávka vody: 50 až 200 l/ha. U ozimín je veľmi výhodná aplikácia pred zimnou dormanciou.

Jabloně, Hrušně: 1 l/ha v stádiu kvetných pukov a na konci kvitnutia *. Neaplikovať v dobe kvitnutia. Je možné aplikovať 1 l/ha po zbere pokiaľ je listová plocha aktívna. Dávka vody 200 až 1000 l/ha.

* U odrôd citlivých na hrđzavitosť oddialiť prvú aplikáciu až na 6 týždňov po kvitnutí.

Kukuřice: 0,3 – 1 l/ha v štádiu od 3 do 8 listov. V prípade silného deficitu opakovat rovnakou dávkou po 10 – 14 dňoch.

Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pri zapnutí miešania prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodou a aplikujte pri zapnutí miešania.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Přečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné pripravky miešať a kombinovať s inými látkami. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie pripravkov je na vlastné riziko užívateľa.

Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu v obmedzenom rozsahu (na skúšku). Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické odporúčenie.

UPOZORNENIE

Produkt je určen k použití iba pre plodiny, ktoré sú špecifikované na etikete prípadne na stránkach www.yaraagri.cz. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie.

SKLADOVANIE

Uchovávejte v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chráňte pred mrazom a extrémnymi teplotami (<-5°C a nad 35°C).

OBCHODNÉ PODMIENKY, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tovar je predávaný v súlade so štandardnými obchodnými podmienkami spoločnosti Yara (k dispozícii na vyžiadanie). Používaním produktu sa kupujúci zaväzuje k súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.

YaraVita™ Zintrac®700



CZ Varování

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391: Uniklý produkt seberte.

SK Pozor

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273: Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. P391: Zozbierajte uniknutý produkt.

Číslo šarže: Viz obal
Datum výroby: Viz obal

Číslo šarže: Pozri vrchnú časť balenia
Dátum výroby: Pozri vrchnú časť balenia



Další rady a informace o produktu získáte QR kódem naskenováním pomocí chytrého telefonu



Ak QR chcete získať ďalšie rady a informácie o produkte, naskenujte pomocou svojho smartfónu

Výrobce/ Vyrobené :
Yara UK Ltd., Manor Place,
Pocklington, York, YO42 1DN, UK.
Tel: 01759 302545
Web: www.yara.com

