



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

**ΚΛΠ 1(Γ)(II)(α) Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα**

Υγρό Ενωτήριομα

Εγγυημένη ανάλυση %:

**40,9% β/β ή 70,9% β/ο = 709 γραμ./λίτρο Ψευδάργυρος (Zn)**  
ως οξειδίου, ολικός

Περιέχει επίσης:

**1% β/β ή 1,7% β/ο = 17 γραμ./λίτρο Ολικό Άζωτο (N)**  
[1% β/β ουρικό άζωτο]

**Συστατικά:** Οξείδιο ψευδαργύρου CAS No 1314-13-2 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών), μονοαιθυλενογλυκόλη CAS No 107-21-1 (ΚΣΥ 1).

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής. Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

Αριθμός παρτίδας/Ημερομηνία Παρασκευής: Βλέπε Συσκαεασία  
**Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηρίασης: +30 2107793777**  
**Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182**

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 143, 171 21 Νέα Σμύρνη. Τηλ.: +30 2109370355 www.yara.gr  
Διανομή στην Κύπρο: **Lambrou Agro Ltd.** P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus. Τ: 357 22667908  
Παρασκευάζεται από: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

## Προσοχή

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.



1 λίτρο

καθαρό βάρος  
1,73 kg

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

**Σιτηρά:** 50 – 100 ml/στρέμμα από το στάδιο των 2 φύλλων έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (κλίμακα Zadok 12 έως 31), με 1 ή 2 επαναλήψεις ανά 10-14 ημέρες σε περιπτώσεις μετρία προς σοβαρής ανεπάρκειας. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 5 έως 20 lt/στρέμμα.

**Καλαμπόκι:** 100 ml/στρέμμα από το στάδιο των 3 - 8 φύλλων. Σε περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας, επαναληπτικές εφαρμογές ανά 10- 14 ημέρες. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 3 έως 20 lt/στρέμμα.

**Ρύζι:** 100 ml/στρέμμα κατά την έναρξη του αδελφώματος και εκ νέου κατά την αρχή εμφάνισης της φύβης. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 3 έως 20 lt/στρέμμα.

**Φασόλια:** 50 – 100 ml/στρέμμα όταν το φυτό έχει ύψος 5 έως 15 εκ. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 3 έως 20 lt/στρέμμα.

**Πατάτες:** 100ml/στρέμμα μία εβδομάδα μετά το πλήρες φύτευμα. Σε περιπτώσεις μετρία έως σοβαρής ανεπάρκειας, ενδέχεται να χρειαστούν επαναληπτικές εφαρμογές ανά 10- 14 ημέρες. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 5 lt/στρέμμα.

**Τομάτα (υπαίθρια):** 30-100 ml/στρέμμα στο στάδιο των 4 - 6 φύλλων. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 7 lt/στρέμμα.

**Αμπέλι (οινοποίηση & επιτραπέζια):** 100 ml/στρέμμα κατά την εμφάνιση των μπουμπουκιών και εκ νέου κατά την καρπόδεση. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρέμμα.

**Καρπούζια (υπαίθρια):** 50 ml/στρέμμα. Τρεις εφαρμογές στις 15, 30 και 45 ημέρες μετά το φύτευμα. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 lt/στρέμμα.

**Βαμβάκι:** 50-100 ml/στρέμμα, 3 έως 4 εβδομάδες μετά το φύτευμα. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 5 lt/στρέμμα.

**Κολοκυθάκια, Αγγούρια (υπαίθρια):** 30-100ml/στρέμμα κατά το στάδιο των 2 - 4 φύλλων. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 5 lt/στρέμμα.

**Ακρόδρυα (φυλλοβόλα):** 100 ml/στρέμμα κατά την έκπτυξη των οφθαλμών την άνοιξη. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε έπειτα από 10-15 ημέρες. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 έως 100 lt/στρέμμα.

**Μήλα:** 50-100 ml/100 λίτρα νερό (μέγιστη δόση 200 ml/στρέμμα) κατά την έκπτυξη των οφθαλμών καθώς και στο τέλος της ανθοφορίας. Αποφεύγετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. (Στις ευαίσθητες στη σκωριόχρωση ποικιλίες αποφεύγετε τις εφαρμογές μετά την ανθοφορία και περιμένετε έως 6 εβδομάδες μετά την πτώση των πετάλων). Μία ακόμη εφαρμογή μπορεί να γίνει μετά τη συγκομιδή, αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Μέγιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 200 lt/στρέμμα.

**Βερικόκα, Κεράσια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια:** 100 – 200 ml/στρέμμα κατά το στάδιο των χειμερινών οφθαλμών και εκ νέου κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής. 100 – 200 ml/στρέμμα μετά τη συγκομιδή αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 έως 100 lt/στρέμμα.

**Εσπεριδοειδή:** 100-200 ml/στρέμμα κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης ανάπτυξης της βλάστησης και εκ νέου κατά τη φθινοπωρινή ανάπτυξη της βλάστησης. Και στις 2 περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί μια επαναληπτική εφαρμογή μετά από 10-14 ημέρες, εφόσον υπάρχει μέτρια έως σοβαρή ανεπάρκεια. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 lt/στρέμμα

(συνθησμένη ποσότητα: 200-400 lt/στρέμμα).

**Ελιές:** 50 ml/100 lt νερό (με μέγιστη δόση 100 ml/στρέμμα) πριν από την ανθοφορία. Μέγιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 200 lt/στρέμμα.

**Αχλάδια:** 100 – 200 ml/στρέμμα κατά την έκπτυξη των οφθαλμών. Απαιτείται μία ακόμη εφαρμογή ποσότητας από 100 – 200 ml/στρέμμα μετά τη συγκομιδή, αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 έως 100 lt/στρέμμα.



Για περαιτέρω συμβουλές και πληροφορίες προϊόντος, σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το smartphone σας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξμενη, μέσω του σιμίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.bankmix.com](http://www.bankmix.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτων, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στο MSDS για περισσότερες πληροφορίες, που διατίθεται στη διεύθυνση [www.yara.com](http://www.yara.com).

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (-5°C < και <35°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

### ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπι αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

