



YaraVita™

Molytrac™ 250



1 litres/
litros

Net Weight/
Peso líquido
1.61Kg

NOTICE

Before using this product, read the entire label

ATENÇÃO

Antes de usar este produto, leia o rótulo completo

LIQUID/LÍQUIDO

Molybdenum based fertiliser solution (sodium molybdate)
Solução de fertilizantes à base de molibdênio (molibdato de sódio)

Guaranteed analysis - Soluble in water/ Garantias - Solúveis em água:

15.5% = **250g/l phosphorus pentoxide/ pentóxido de fósforo (P₂O₅)**

15.5% = **250g/l molybdenum/ molibdênio (Mo)**

ZEMA Product number: PN 2057

DSV n°: 517

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Keep under lock and key and out of reach of children.

Always wash your hands after using fertilizer.

Do not eat, drink or smoke while using fertilizer.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO

Mantenha a chave fechada e fora do alcance das crianças.

Lave sempre as mãos depois de usar fertilizante.

Não coma, beba ou fume enquanto estiver usando fertilizante.

Local distributor:

Company name: **Yara Fertilizer Zambia Ltd.**

Physical/Postal Address: PO BOX 35390: Sub 32, Farm 4300,

Sandy's Creation, Lilayi, Lusaka, Zambia.

Telephone number: +260 960 283 590

Agente: **YARA MOZAMBIQUE LDA.**, Bloco 2, Rua 6 Talhão No 485 Bairro Da Manga, Beira, Mozambique. Tel: +258 84 2317290
Manufacturer/Supplier: Yara UK Ltd.

Physical/ Postal Address: Manor Place, Pocklington, York, YO42

IDN, Telephone number: 01759 302545

APPLICATION RATES AND TIMINGS

Barley: 125 to 250 mls/ha from the 5 leaf stage until the end of tillering (Zadoks G.S. 15 to 29).

Water rate: 30 to 200 l/ha.

Maize: 0.25 to 0.5 l/ha at the 6 to 8 leaf stage.

Water rate: 50 to 200 l/ha.

Soya Bean: 0.25 to 0.5 l/ha when crop is 5 to 15 cm tall, repeated at 10 to 14 day intervals if necessary.

Water rate: 30 to 200 l/ha.

Tobacco: 0.25 l/ha applied at 10 day intervals as necessary from two to three weeks after transplanting up to pre-flowering. Water rate: 30 to 500 l/ha.

Wheat: 125 to 250 mls/ha from the 5 leaf stage until the end of tillering (Zadoks G.S. 15 to 29).

Water rate: 30 to 200 l/ha.

DIRECTIONS FOR USE

ALWAYS FOLLOW THESE LABEL INSTRUCTIONS

Mix the product thoroughly before use. Slowly add the product to the tank, via the induction hopper, whilst agitating. Top up with water and continue to agitate until spraying is completed.

TANK MIXING/CO-APPLICATION

Read ALL labels carefully and adhere strictly to the instructions for use. Co-application is entirely at the risk of the end-user. Before co-application of products you, or your advisor, must visit www.tankmix.com for important information. Alternatively, contact Yara for specific advice.

PRECAUTIONS

Only to be used on protected crops if specifically listed. Avoid application under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Wear suitable gloves and face shield when handling this product. Clean all equipment before and after use. Please refer to the SDS for further information, available at www.yara.com.

STORAGE

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock. Protect from temperature extremes (-5°C < and <35°C). Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

CONDITIONS OF SALE

This Product is sold subject to the seller's Terms and Conditions of Sale, which are available upon request. Use of the Product is acceptance by the buyer of the Terms and Conditions of Sale.

TAXAS E TEMPOS DE APLICAÇÃO

Cevada: 125 a 250 mls /ha desde o estádio de 5 folhas até ao final do afilhamento (Zadoks G.S. 15 a 29).

Taxa de água: 30 a 200 l/ha.

Milho: 0,25 a 0,5 l/ha no estádio de 6 a 8 folhas. Taxa de água: 50 a 200 l/ha.

Soja: 0,25 a 0,5 l/ha quando a cultura tiver 5 a 15 cm de altura, repetida em intervalos de 10 a 14 dias necessário. Taxa de água: 30 a 200 l/ha.

Tabaco: 0,25 l/ha aplicado em intervalos de 10 dias, conforme necessário, de duas a três semanas após o transplante até o pré-florescimento.

Taxa de água: 30 a 500 l/ha.

Trigo: 125 a 250 mls /ha desde o estádio de 5 folhas até ao final do afilhamento (Zadoks G.S. 15 a 29).

Taxa de água: 30 a 200 l/ha.

MODO DE EMPREGO

SEGUIR SEMPRE AS INSTRUÇÕES QUE CONSTAM DO RÓTULO

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar fortemente a embalagem até o produto ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MISTURA EM TANQUE E CO-APLICAÇÃO

Leia cuidadosamente toda a etiqueta e siga rigorosamente as instruções de uso. A co-aplicação é da estrita responsabilidade do consumidor final. Antes de qualquer aplicação de produtos deve o seu assessor visitar www.tankmix.com, em alternativa podem se informar contactando um representante da Yara.

PRECAUÇÕES

Apenas deve ser usado em colheitas protegidas se especificamente listadas. Evitar a aplicação sob condições de clima extremas, ex. Condições de secagem rápida, condições de secagem extremamente lentas, gelo, chuva, ou quando se prevêem chuva e gelo. Utilizar luvas e proteção facial adequadas ao manusear este produto. Limpar todo o equipamento antes e depois de cada utilização. Consulte a MSDS para obter mais informações, disponível em www.yara.com.

ARMAZENAGEM

Guardar num armazém químico fresco e seco, for a do alcance de crianças e gado. Proteger do gelo e outros climas extremos. (-5°C < e <35°C). Dispor de rotulos e embalagens em conformidade com todos os regulamentos locais, regionais e internacionais.

CONDIÇÕES DE VENDA

Este produto esta sujeito aos termos e condições do vendedor, os quais se encontram disponíveis a pedido do comprador. O uso deste produto por parte do comprador representa a aceitação dos termos e condições de venda.