



YaraVita™
Stopit™

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

Stopit™

ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(Ι) Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

Ca (16,9)

Υγρό Διάλυμα

Εγγυημένη ανάλυση:

16,9% β/β ή 22,4% β/ο = 224 γραμ./λίτρο Οξειδίο του Ασβεστίου (CaO)
υδατοδιαλυτό

Συστατικά: Χλωριούχο ασβέστιο. CAS No. 10043-52-4 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών).

Αριθμός παρτίδας/Ημερομηνία Παρασκευής: Βλέπε Συσκευασία

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 137, 171 21 Νέα Σμύρνη. Τηλ.: +30 2109370355 www.yara.gr
Διανομή στην Κύπρο: **Lambrou Agro Ltd**, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus. Τ: 357 22667908

Παρασκευάζεται από: **Yara UK Ltd**. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777

Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182

UFI: T010-20AY-J00Q-XWVV

Προσοχή

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

P280-a: Να φοράτε μέσα προστασίας

για τα μάτια. P264-a: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.



5 λίτρα

καθαρό βάρος
6,64kg

YaraVita™ Stopit™

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μήλα, Αχλάδια: Τακτικές εφαρμογές με δόση 1 lt/στρέμμα, σε διαστήματα 7-14 ημερών από το στάδιο της πτώσης των πετάλων, έως μία εβδομάδα πριν από τη συγκομιδή.

Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 15-50 lt/στρέμμα.

Βερίκοκα, Κεράσια, Νεκταρίνια, Ροδάκινα: Τακτικές εφαρμογές με δόση 0,5 -1 λίτρο/στρέμμα, σε διαστήματα 7-14 ημερών από το στάδιο της πτώσης των πετάλων, έως μία εβδομάδα πριν από τη συγκομιδή. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 15 lt/στρέμμα.

Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): 0,5-1 λίτρο/στρέμμα. 2-3

εφαρμογές σε διαστήματα 7-14 ημερών ξεκινώντας από το στάδιο της καρπόδεσης. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50-100 lt/στρέμμα.

Εσπεριδοειδή: 0,5 lt/στρέμμα από την καρπόδεση έως ένα μήνα πριν από τη συγκομιδή σε διαστήματα 10-14 ημερών.

Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 lt/στρέμμα

Ακτινίδια: 3 εφαρμογές των 0,5 lt/στρέμμα, ξεκινώντας μέσα σε 5 ημέρες από την πτώση των πετάλων και επαναλαμβάνοντας σε 30-35 ημέρες, καθώς και σε 40-45 ημέρες από την πτώση των πετάλων. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 έως 100 lt/στρέμμα.

Μελιτζάνες (υπαίθρια): 2-4 εφαρμογές των 500 ml/στρέμμα σε τουλάχιστον 50 lt νερό ανά στρέμμα, από το τέλος της ανθοφορίας και σε διαστήματα 7 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.

Αγγούρια, Κολοκυθάκια (υπαίθρια): 2-3 εφαρμογές των 500 ml/στρέμμα με τουλάχιστον 20 lt νερό ανά στρέμμα, ξεκινώντας από την καρπόδεση και σε διαστήματα 7 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.

Πεπόνια (υπαίθρια): 500 ml/στρέμμα, 3-5 εφαρμογές από την αρχή της καρποφορίας έως τη διόγκωση των καρπών, σε διαστήματα 7-10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.

Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 50 lt/στρέμμα.

Πιπεριές (υπαίθρια): 1-4 εφαρμογές των 500 ml/στρέμμα, ξεκινώντας από το σχηματισμό της δεύτερης ταξιανθίας. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 5 lt/στρέμμα.

Τομάτα (υπαίθρια): Εφαρμογές των 500 ml/στρέμμα, ξεκινώντας από το σχηματισμό της δεύτερης ταξιανθίας. Επανάληψη ανά διαστήματα 7-14 ημερών.

Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 5 lt/στρέμμα.

Καρπούζια (υπαίθρια): 500 ml /στρέμμα. 2-3 εφαρμογές ξεκινώντας από την καρπόδεση και σε διαστήματα 7 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.

Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρέμμα.

Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Μέγιστη συγκέντρωση: 0,5 λίτρα ανά 100 lt νερό. Μέγιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 100 lt/στρέμμα. Για την κατάλληλη χρονική στιγμή όσον αφορά την εφαρμογή του προϊόντος, ανατρέξτε στην αντίστοιχη υπαίθρια καλλιέργεια.



Για περαιτέρω συμβουλές και πληροφορίες προϊόντος, σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το smartphone σας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμίξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στοίχιου επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύετε.

Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκαιρα αποκλείεται στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει οεσής ή ο συμβουλευός σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tankmix.com για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτας, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στο MSDS για περισσότερες πληροφορίες, που διατίθεται στη διεύθυνση www.yara.com.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (-5°C < και <35°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

