



YaraVita™

Thiotrac™



10 L

Neto težina  
Nettó tömeg  
Greutate netă  
11,77kg

# Thiotrac™

## HR UPOZORENJE

Prije korištenja proizvoda obavezno pročitati uputu za upotrebu.

### PFC 1(C)(I)(b)(i) Jednostavna tekuća anorganska gnojiva s makrohranjivima

N (S) 15,2 (+62)

Tekuća otopina

Sadržaj % w/w:

**15,2% (= 200 g/l) ukupni dušik (N)**

[10,5% dušik amonijski, 4,7% amidni dušik]

**62% (= 816 g/l) sumporni trioksid (SO<sub>3</sub>)** topiv u vodi

**Sastojci:** Amonijev tiosulfat CAS n° 7783-18-8 (CMC 1: Tvari i smjese iz neprerađenih sirovina), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu. Ovo gnojivo sadrži ureu, koja može otpustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere sanacije.

Serijski broj/ Datum izrade: Pogledajte na pakiranju

Rok trajanja: 5 godina od datuma proizvodnje

Uvezeno od: **Yara Hungária Kft.**

8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary. Tel: +36 88 577 940

Distributer: **Cipro d.o.o.**, Lepajci 4a, 49000 Krapina.

Tel: 049/382-000, Web: [www.cipro.hr](http://www.cipro.hr)

## HU FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

### PFC 1(C)(I)(b)(i) Egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervesetlen trágya

N (S) 15,2 (+62)

Folyékony oldat

Tartalom tömegszázalék:

**15,2% (= 200 g/l) összes nitrogén (N)**

[10,5% ammónia-nitrogén, 4,7% karbamid-nitrogén]

**62% (= 816 g/l) kén-trioxid (SO<sub>3</sub>)** vízoldható

**Összetevők:** Ammónium-tiosulfát CAS n° 7783-18-8 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

Importálta: **Yara Hungária Kft.**

8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary. Tel: +36 88 577 940

# YaraVita™ Thiotrac™

## RO ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citește întreaga etichetă.

### PFC 1(C)(I)(b)(i) Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelement

N (S) 15,2 (+62)

Soluție lichidă

Conținut % din masă:

**15,2% (= 200 g/l) azot (N) total**

[10,5% azot amoniacal, 4,7% azot ureic]

**62% (= 816 g/l) trioxid de sulf (SO<sub>3</sub>) solubil în apă**

**Compoziție:** tiosulfat de amoniu CAS n° 7783-18-8 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), uree CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Numarul lotului/ Data fabricației: vezi pe bidon

Expiră la: 5 ani de la data fabricației

Importat de: **Yara Poland Sp. z o.o.**

ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin

Tel. (091) 433 00 35

Proizvodi/ Által termelt/ Produs de:

**Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK.

Tel: 01759 302545 Web: [www.yara.com](http://www.yara.com)



WLHUYPB6M02 V09.22

**Primjena/doze primjene**

**Češnjak:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha kad je biljka visoka 15 cm, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u intervalima 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Krumpir:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha tjedan dana po 100% izrastu i po potrebi tretiranje ponoviti u intervalima 10-14 dana. Preporučena količina vode : 200 lit/ha.

**Kukuruz:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-8 listova, a u slučaju jačeg nedostatka, tretiranje ponoviti kroz 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Luk:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha kad je biljka visoka 15 cm, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u intervalima 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Maslina:** tretiranje obaviti jednom pred cvatnju u dozi 5,0- 10,0 lit/ha. Preporučena količina vode: 1000 lit/ha.

**Mrkva:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha kad je biljka visoka 15 cm, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u intervalima 10-14 dana; Količina vode 200 l/ha.

**Poriluk:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha kad je biljka visoka 15 cm, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u intervalima 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Rajčica (uzgoj na otvorenom):** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha u trenutku kad kad se razvije 4-6 listova na glavnoj stabljici i tretiranje ponoviti kroz 10-14 dana. Ne tretirati u cvatnji. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Salata (uzgoj na otvorenom):** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4 do 6 listova, i ako je potrebno tretiranje ponoviti jedan ili dva puta u razmacima 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Šećerna repa:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-6 listova, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u razmacima 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Suncokret:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-6 listova. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Trava za silažu:** primijeniti u dozi 10,0 lit/ha 4 tjedna pred košnju. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Vinova loza:** primijeniti u dozi 3,0-5,0 lit/ha u trenutku razvoja bobica i ako je potrebno tretiranje ponoviti jedan ili dva puta u razmacima 10-14 dana. Ne tretirati u cvatnji. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Zitarice:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha u početku stvaranja koljenca, pa do prvog koljenca (Zadoks 30-31). Preporučena količina vode: 200 lit/ha. Pšenica:

primijeniti u dozi 3,0-5,0 lit/ha od sredine klasanja do kasne mlječne zriobe (Zadoks 55-79). Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**UPUTE ZA KORIŠTENJE**

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi. Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indukcijskog lijevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

**TANK MIX KOMPATIBILNOST (MIJEŠANJE)**

Strogo se pridržavajte uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvod pregledajte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

**UPOZORENJE**

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju i ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja. Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistite uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

**SKLADIŠTENJE**

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

**UVJETI PRODAJE**

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvaća ove uvjete prodaje.

**Felhasználási javaslat.  
LOMBKEZELÉS**

**Bab:** 5-10 l/ha a növény 4-6 leveles állapotától. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételjük meg a kezelést. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha, légigépes kijuttatásnál minimum 50 l/ha víz szükséges.

**Borsó:** 5-10 l/ha a növény 4-6 leveles állapotától. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételjük meg a kezelést.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Borszóló:** 3-5 l/ha adagban a virágkezdemények megjelenésekor, fűrtmegnyulás alatt és kötődéskor. Kötődés után, a megfelelő fejlődés érdekében a kijuttatás még egy vagy két alkalommal 10-14 naponként megismételhető. Virágzás idején ne alkalmazzuk. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Burgonya:** 5-10 l/ha adagban, 5-10 cm-es növénymagasságtól.

Hiánytünetek esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: - minimum 200 l/ha - légi kijuttatás: minimum 50 l/ha

**Cukorrépa:** 5 l/ha adagban, 4-6 leveles állapottól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Gabonafélék:** 5 l/ha a növény szárbaindulásától (Zadok. 30-31 fenológia). Hiánytünet, intenzív vagy minőségi termesztés esetén 10-14 naponként ismételve. Javító vagy malmi búza: 5 l/ha adagban a fülescepe teljes kifejlődésétől a szemek teljes éréséig (Zadok 59-79). Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha, légi kijuttatás esetén: minimum 50 l/ha.

**Hagymafélék:** 5-10 l/ha adagban, 15 cm-es növénymagasságtól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Káposztafélék:** 5-10 l/ha adagban, a növény 4-6 leveles állapotától. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Kukorica:** 5 l/ha 4-8 leveles állapotban. 10-14 nap elteltével ismételjük meg a kezelést, ha szükséges. Vízmennyiség: 200 l/ha.

**Napraforgó:** 5 l/ha adagban, a növény 4-6 leveles állapotától. Szüksége vízmennyiség: - minimum 200 l/ha - légi kijuttatás: minimum 50 l/ha.

**Olajrepcé:** 5-10 l/ha adagban, kora tavasztól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Virágzás idején ne alkalmazzuk. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Paradicsom (szabadföldi):** 5 l/ha adagban, a növény 4-6 leveles állapotától. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Virágzás idején ne alkalmazzuk. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha

**Sárgarépa, gyökérzöldségek:** 5-10 l/ha adagban, 15 cm-es növénymagasságtól. Hiánytünet esetén 10-14 naponként ismételve. Szükséges vízmennyiség: minimum 200 l/ha.

**Szója:** 5-10 l/ha a növény 4-6 leveles állapotában. 10 naponta szükséges ismételni. Vízmennyiség: 200 l/ha. Esetlegesen: 5 l/ha a növény 2-6 leveles állapotában. szükség esetén 10-14 naponta ismételjük a kezelést. Vízmennyiség: 30-200 l/ha.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS****Mindig kövesse a címke utasításait**

Felhasználás előtt alaposan felrándandó.

Töltse fel a permetezőgépet tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

**KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS**

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

**FIGYELMEZTETÉS**

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárású viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítson meg minden eszközt.

**TÁROLÁS**

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárású körülményektől (40°C feletti hőmérséklettől) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

**ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK**

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

## DOZE SI MOMENT DE APLICARE

**Broccoli, Conopidă, Varză, Varză de Bruxelles:** 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

**Cartofi:** o aplicare de 5 l/ha la o săptămână după apariția 100% a creșterilor vegetative (frunze). O a doua aplicare poate fi făcută după 10-14 zile. De asemenea 5 l/ha în perioada de mărire a tubercuilor. Doza de apă: 200 l/ha.

**Ceapă, Morcov:** 5 l/ha la faza de 15 cm sau când frunzele sunt suficient de dezvoltate pentru a intercepta soluția. Pentru deficiență moderată până la severă se poate repeta la interval de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

**Cereale:** 5 l/ha de la împiere la apariția primului nod (G.S. 30-31), în caz de deficiență se poate repeta la 10-14 zile. Alternativ se poate utiliza 2-3 l/ha în 2 aplicări repetate la interval de 10-14 zile, de la înfrățire până la primul nod vizibil. Doar Grâu: suplimentar se aplică doza de 3-5 l/ha și în stadiul de apariția spicului până la faza de lapte (G.S.59-79), sau în doză de 5 l/ha în faza de frunză stindard până la faza de lapte (G.S.39-79) pentru creșterea proteinei. Doza de apă 200 l/ha.

**Fasole, Mazăre:** 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

**Floarea soarelui:** 5 l/ha în faza de 4-6 frunze complet dezvoltate. Doza de apă: 200 l/ha.

**larbă siloz:** 10 l/ha cu 4 săptămâni înainte de fiecare tăiere. Doza de apă: 200 l/ha.

**Măr:** 3-5 l/ha înainte de începutul înfloritului și se repetă la căderea petalelor, dacă este necesar. Doza de apă: 500-1000 l/ha.

**ATENȚIE!** A nu se aplica în timpul înfloritului. Acest produs conține ingrediente activi care, când se utilizează în doză de 15 l/ha, au fost constatate nedeveloparea fructelor. Tot această doză poate cauza răsucirea frunzelor, Yara nu garantează acest tip de aplicare.

**Porumb:** 5 l/ha la etapa 4-8 frunze. Pentru deficiențe moderate până la severe, ar trebui să se repete doza de mai sus la intervale de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

**Rapită:** 5-10 l/ha în faza de apariție și alungirea tijeii. Se poate face fertilizare suplimentară după 10-14 zile până la începutul înfloririi. A nu se aplica în timpul înfloritului. Doza de apă: 200 l/ha.

**Sfecla de zahăr:** 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

**Sfeclă roșie:** 5 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

**Sorg:** 5 l/ha la etapa 4-8 frunze. Pentru deficiențe moderate până la severe, ar trebui să se repete doza de mai sus la intervale de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### ÎNTOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

### COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

### PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, îngheț, ploaie, sau când sunt prevenirea de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

### DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropiere de viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (temperaturi peste 40° C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

### CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.