



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

Βιοδιεγέρτης που αυξάνει τον αριθμό των καρπών και το μέσο βάρος αυτών, ενισχύει το πρασίνισμα του φυτού και αυξάνει την απόδοση.

## ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

## ΚΛΠ 6 (B) Μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

**Συστατικά:** Εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum*  
CAS 84775-78-0 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)

Αριθμός παρτίδας/Ημερομηνία Παραγωγής: Βλέπε Συσσκευασία  
Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777 (Ελλάδα)  
Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 211983182  
Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 (Κύπρος)

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 137, 171 21 Νέα Σμύρνη. Τηλ.: +30 2109370355 [www.yara.gr](http://www.yara.gr)  
Διανομή στην Κύπρο: **Lambrou Agro Ltd**, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus. T: 357 22667908  
Παρασκευάζεται από: **Yara UK Ltd**, Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι δόσεις και ο τρόπος εφαρμογής πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την θεραπευτική κατάσταση της καλλιέργειας.

### Υπό κανονικές συνθήκες:

**Σταφύλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):** 100-200 ml/στρ. 3-4 εφαρμογές που καλύπτουν τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, όπως η έναρξη της βλάστησης και το στάδιο μετά την καρπόδεση με 1-2 εφαρμογές. Χρησιμοποιείστε επαρκή ποσότητα νερού για καλή κάλυψη κατά τον ψεκασμό. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

**Ακτινιδιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Μηλιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Αβokάντο, Αμυγδαλιά, Κηλιά, Φιστικιά, Εσπεριδοειδή, Ροδιά:** 200 ml/στρ. 4-5 εφαρμογές που καλύπτουν τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, όπως η βλαστική ανάπτυξη, η πτώση των πετάλων και κατά το πρώτο στάδιο μεγέθυνσης των καρπών. Χρησιμοποιείστε επαρκή ποσότητα νερού για καλή κάλυψη κατά τον ψεκασμό. Μέγιστη συγκέντρωση για διαφυλλικές εφαρμογές 500 ml ανά 100 lt νερό.

**Ελιά:** 200 ml/στρ. 4-5 εφαρμογές που καλύπτουν τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, όπως η βλαστική ανάπτυξη, η πτώση των πετάλων και κατά το πρώτο στάδιο μεγέθυνσης των καρπών. Χρησιμοποιείστε επαρκή ποσότητα νερού για καλή κάλυψη κατά το ψεκασμό. Μέγιστη συγκέντρωση για διαφυλλικές εφαρμογές 500 ml ανά 100 lt νερό.

**Βαμβάκι:** 100-200 ml/στρ. 3 εφαρμογές. Ξεκινήστε την εφαρμογή από το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, την εμφάνιση των πρώτων χτενιών και στην εμφάνιση των πρώτων άνθεων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

**Τομάτα, Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Πιπεριά, Φρέουλα :** 100-200 ml/στρ. 4-5 εφαρμογές που καλύπτουν τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, όπως η βλαστική ανάπτυξη, η πτώση των πετάλων και κατά το πρώτο στάδιο μεγέθυνσης των καρπών. Οι δόσεις των εφαρμογών θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος του φυτού και τη φυλλική επιφάνεια. Χρησιμοποιείστε επαρκή ποσότητα νερού για καλή κάλυψη κατά τον ψεκασμό. Μέγιστη συγκέντρωση για διαφυλλικές εφαρμογές 500 ml ανά 100 lt νερό.

**Πατάτα, Καρότα, Ραπανάκι:** 200 ml/στρ. 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 με 15 ημέρες. Ξεκινήστε τις εφαρμογές όταν οι ρίζες ή οι κόνδυλοι αρχίσουν να αναπτύσσονται. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

**Σταυρανθή (Κουνοπιπίδι, Λαχανάκι Βρυξελλών, Λάχανο, Μπρόκολο), Κρεμμύδι, Πράσο:** 100-200 ml/στρ. 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 με 15 ημέρες αν είναι απαραίτητο. Ξεκινήστε τις εφαρμογές 10 ημέρες μετά την εμφάνιση των φυτών ή από το στάδιο των 3-4 φύλλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού: 20 lt/στρ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΝΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**  
Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομιού επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός. Συνιστάται να κάνετε τη θεραπεία τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας για να εκμεταλλευτείτε τις στιγμές του μέγιστου απορρόφησης του φυτού. Να χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Αυτό το προϊόν, αφού αραιωθεί, αναμειγνύεται με τα περισσότερα κοινώς χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά ενεργά συστατικά και προϊόντα λίπανσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκαιρα αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ζερασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στο MSDS για περισσότερες πληροφορίες, που διατίθενται στη διεύθυνση [www.yara.com](http://www.yara.com).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**  
Για να αποφευχete κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις συνηθισμένες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπανσης. Απορρίψτε το περιεχόμενο και τον περιεχτικό σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο κατάλληλο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Το προϊόν είναι σταθερό σε συνηθισμένες θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C και 40°C.

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους υποτιμημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

