

YaraVita Bortrac

DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN

Alfalfa: Aplicar 1 a 2 l/ha luego del corte, cuando haya suficiente cobertura foliar cada 3 o 4 cortes. Volumen de agua: 50 a 200 l/ha

Ajodón: 3 aplicaciones de 1 a 2 l/ha con el cultivo en 4 a 6 hojas, en yemas florales, y nuevamente cuando las flores se encuentran abiertas. Volúmen de agua: 20 a 150 l/ha

Arándano: Aplicar 2 l/ha justo antes del comienzo de caída de las hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación. Volumen de agua: 200 l/ha

Brócoli: 3 l/ha en 4-6 hojas, con repetición de la aplicación en la misma dosis, a intervalos de 10 a 14 días en caso de deficiencia moderada a severa. Volumen de agua: 50 a 200 l/ha.

Caña De Azúcar: 2 l/ha con cañas entre 30 y 120 cm de altura. De ser necesario repetir esta aplicación 10 a 14 días después. Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.

Cirueta, Durazno: Primavera: 1 a 2 l/ha en la yema de invierno y otra más en la yema rosada o 3 aplicaciones de 1 l/ha o 2 aplicaciones de 2 l/ha después de la caída de los pétalos, repetidas en intervalos de 7 a 14 días. Otoño: 2 a 3 l/ha después de la cosecha pero antes de que mueran las hojas. Volumen de agua: 150 l/ha como mínimo.

Cultivos Protegidos/Invernáculos: aplicar 100 cc/100 lts de agua como concentración máxima. Volumen de agua máximo 1000 l/ha. Refiérase a cada cultivo en campo para momentos de aplicación.

Espinaca: 1 l/ha a partir de las 4-6 hojas. Repetir en intervalos de 10 a 14 días según sea necesario. Volumen de agua: 200 l/ha.

Frutilla (A Campo): Dos aplicaciones 1 a 1.5 l/ha a partir de la fase de yemas verdes/blancas. Repetir 10 a 14 días más tarde. 2 l/ha en el rebrote (después de la cosecha). Volumen de agua: 200 a 500 l/ha.

Girasol: 2 a 3 l/ha desde 2 pares de hojas hasta botón floral. Repetir si es necesario en intervalos de 10 a 14 días dentro de este período. Volúmen de agua: 30 a 200 lts/ha.

Papa: 1 l/ha 10-14 días después 100% de la emergencia. Volumen de agua: 200 l/ha.

Lechuga (A Campo): 1 a 2 l/ha, de 10 a 20 días luego del trasplante o emergencia. Volumen de agua: 500 l/ha.

Manzanas: 1 l/ha a yema rosa, comienzo de la floración y la caída de los pétalos. Se recomienda aplicar además a 2 l/ha después de la cosecha y antes de la caída de las hojas. Volumen de agua: 500 a 1.000 l/ha.

Pepino (a campo): 1 a 2 l/ha en cuanto haya suficiente follaje como para interceptar la pulverización. Se puede repetir la aplicación con la misma proporción, 10 a 14 días más tarde. Volumen de agua: 50 a 200 l/ha.

Pimiento (A Campo): 2 a 3 l/ha a partir del comienzo de la floración y hasta la fructificación, repetir la aplicación 2 veces a intervalos de 10 a 14 días si es necesario. Volumen de agua: 200 l/ha.

Soja: Aplicar 1 a 2 l/ha con plantas entre 5 a 15 cms de altura (VI), pudiendo repetir con intervalos de 10 a 14 días después hasta antes de inicio de floración (R1). Volumen de agua: 50 a 200 l/ha.

Tomate (A Campo): 1 l/ha antes de la floración. Repetir aplicación después de la floración. Volumen de agua: 200 l/ha.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA. *Agitar el envase fuertemente* antes de usarlo. Verter el producto a través de un filtro al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN TANQUE/COAPLICACIÓN

Lea con mucha atención TODAS las etiquetas y cumpla estrictamente con las instrucciones de uso y los consejos con referencia a si el/los producto/s debería/n ser coaplicados. Existen muchas variables, que quedan fuera del control de Yara, que pueden influir en el rendimiento de los productos coaplicados, por lo que la coaplicación corre a riesgo del usuario final. Se recomienda con insistencia que al utilizar mezclas de productos desconocidos se realice una aplicación limitada inicialmente. Antes de coaplicar productos Ud. o su asesor deberán visitar www.tankmix.com para consultar información importante. Si no, diríjase a Yara para solicitar consejos específicos.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperan heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuada al manejar este producto. Limpie todo el equipo después del uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. *Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C)*

CONDICIONES DE VENTA – GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Yara garantiza que el producto en el recipiente sin abrir cumple con la descripción química indicada en esta etiqueta. Deben seguirse con mucha atención las instrucciones de esta etiqueta, las cuales se basan en pruebas que se consideran fiables. Puesto que las condiciones meteorológicas/de la tierra inusuales y el uso de este producto quedan fuera del control de Yara, no se da garantía explícita o implícita a los efectos de dicho uso ni de los resultados obtenidos, y en ningún caso la responsabilidad de Yara superará el precio del producto usado. El comprador deberá asumir todos los riesgos de almacenamiento, uso o aplicación de este producto. Los productos se venden sujetos a las condiciones de venta normales de Yara UK Ltd; disponibles a petición del cliente. El uso del producto implica que el comprador acepta estas Condiciones de venta.