

YaraVita Agripotash™

RECOMENDACIONES DE USO

Brásicas: 5 l/Ha a 4-6 hojas verdaderas. Repetir si fuese necesario en caso de moderadas a severas deficiencias en intervalos de 7 a 14 días. Volumen de agua: 200 l/Ha.

Cebolla: 5 l/Ha cuando las hojas tengan suficiente superficie para asimilar la aplicación. Volumen de agua: 200 a 500 l/Ha.

Cerezo: 3 aplicaciones de 3 a 5 l/Ha en intervalos de 10 a 14 días desde el endurecimiento del hueso. Volumen de agua: 500 a 1.500 l/Ha.

Ciruelo: 3 aplicaciones de 3 a 5 l/Ha en intervalos de 10 a 14 días desde el endurecimiento de carozo. Volumen de agua: 500 a 1.500 l/Ha.

Cítricos: 3-5 l/Ha desde el cuaja. Repetir la aplicación de 10 a 14 días más tarde en caso de moderadas a severas deficiencias. Volumen de agua: 500 a 1.500 l/Ha.

Durazno: 3 aplicaciones de 3 a 5 l/Ha en intervalos de 10 a 14 días desde el endurecimiento del hueso. Volumen de agua: 500 a 1.500 l/Ha.

Lechuga: 3-5 l/Ha a 14-20 días después de la etapa de 4 a 6 hojas. Se puede repetir en caso de necesidad en intervalos de 10 a 14 días. No se puede aplicar durante el último mes antes de la cosecha. Volumen de agua: 500 l/ha.

Maíz: 3-5 l/Ha en el estadio de 4 a 8 hojas. Cantidad de agua: 30 a 300 l/Ha

Manzano: 5 l/Ha a la aparición de botones florales. También, 2 a 3 aplicaciones de 2 a 3 l/Ha en intervalos de 10 a 14 días desde la caída de pétalos. Se puede realizar una aplicación más de 5 l/Ha después de la cosecha antes de la caída de hojas. Volumen de agua: 500 l/Ha.

Melón: 3 l/ha en 4 a 6 hojas. Se puede repetir en 10 a 14 días de ser necesario. Volumen de agua: 500 a 1.000 l/ha.

3-5 l/ha en brotación de primavera. Volumen agua 500-1500 l/ha.

Olivo: 3 a 5 l/Ha en el comienzo del cuajado del fruto. Repetir en intervalos de 10 a 14 días si fuese necesario. Volumen de agua: 500 a 1.500 l/Ha.

Palto: aplicar 3-5 l/ha a partir del desarrollo temprano de frutos, repitiendo una o dos veces a intervalos de 10 a 14 días en caso de ser necesario. Volumen de agua sugerido 500 a 1000 l(ha)

Papa: 3- 5 l/Ha por 2 aplicaciones durante el crecimiento de tubérculo (cuando los primeros tubérculos tengan 10 mm de diámetro). Dejar 10 a 14 días entre las aplicaciones. Volumen de agua: 200-400 l/Ha.

Peral: 5 l/Ha a la aparición de botones florales. También, 2 a 3 aplicaciones de 2 a 3 l/Ha en intervalos de 10 a 14 días desde la caída de pétalos. Se puede realizar una aplicación más de 5 l/Ha después de la cosecha antes de la caída de hojas. Volumen de agua: 500-1500 l/Ha.

Tomate (en campo): 3 l/ha aplicado después del cuajado de la fruta en el primer racimo y repetido en intervalos de 10 días. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Uva de Mesa: 2.5 l/ha en estado de desarrollo de la baya, repetir en pinta y de ser necesario repetir a los 20 días. Vol de agua 500-1500 l/ha

Viñas: Una o dos aplicaciones de 3 a 5 l/Ha antes del inicio de la floración a intervalos de 15 días. Viña de vinificación 3 a 5 l/Ha al fruto cuando tiene el tamaño 5mm y al principio del envero, un mes antes de vendimia. También, 3 a 5 l/Ha después de la cosecha antes de la senescencia de la hoja. Cantidad de agua: 200 a 500 l/Ha.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.