

YaraVita Last N

DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN

Alfalfa: 10 a 15 l/Ha. Aplicar después de cada cosecha cuando hay follaje suficiente. Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha.

Arroz: 10 a 25 l/Ha a 2-3 hojas verdaderas y a la aparición de la hoja bandera. Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha.

Brásicas: 10 a 15 l/Ha. Aplicar 10-14 días después del aclareo o trasplante. Repetir la aplicación en desarrollo de la cabeza y en intervalos de 10 a 14 días si es necesario.

Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha.

Calabacín, Pimiento, Tomate (En Campo): 10 a 15 l/Ha. Aplicación en cuaje de frutos. Repetir si es necesario 10-14 días más tarde.

Volumen de agua mínimo: 500 l/Ha.

Cereales, Trigo: 11 a 22 l/Ha aplicado desde producción de vástagos hasta emergencia total de la espiga (Zadoks G.S. 21 a 59). Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha. Nota: Aplicaciones foliares tardes de nitrógeno pueden incrementar niveles de nitrógeno en el grano.

Cítricos: 10 a 15 l/Ha antes de la floración y repetido inmediatamente después de cuaje de frutos. Volumen de agua mínimo: 500 l/Ha.

Espinaca: 10 a 15 l/Ha. Aplicar cuando hay follaje suficiente y repetir después de 14-21 días si es necesario.

Volumen de agua mínimo: 500 l/Ha.

Girasol, Sorgo: 10 a 15 l/Ha. Aplicar en la etapa de 4-6 hojas. Repetir si es necesario después de 10-14 días.

Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha

Gulsantes, Judías, Soja: 10 a 15 l/Ha. Aplicar antes de floración.

Repetir la aplicación si es necesario durante el cuaje de vainas.

Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha.

Lechuga (En Campo): 10 a 15 l/Ha. Aplicar 10-14 días después de trasplante o del aclareo. Repetir 14 días más tarde y 14 días antes de cosecha. Volumen de agua mínimo: 500 l/Ha.

Maíz: 11 a 22 l/Ha. Aplicar en la etapa de 4-6 hojas y repetir después de 10-14 días. Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha.

Melón, Sandía (En Campo): 10-15 l/Ha. Aplicar en la etapa de 4-6 hojas. Repetir 10-14 días más tarde si es necesario.

Volumen de agua mínimo: 500 l/Ha.

Olivo: 2 a 5 l/Ha. Aplicar entre el hinchado de yemas y apertura de cáliz. Repetir durante el endurecimiento del fruto a 10-15 l/Ha.

Volumen de agua mínimo: 500 l/Ha.

Remolacha: 10 a 25 l/Ha. Aplicar en la etapa de 4-6 hojas. Repetir si es necesario después de un mes.

Volumen de agua mínimo: 200 l/Ha.

APLICACIÓN AL SUELO / FERTIRRIGACIÓN

10 a 15 l/Ha. Aplicar solo. Mezclar y aplicar inmediatamente. Limpiar el sistema completamente y sin retraso después de la aplicación. NO USAR en sistemas "cerrados" ni "re-circulación". No aplicar a plantas/cultivos en macetas/contenedores. Aplicar en la misma dosis, número de aplicaciones y momentos de aplicación como recomendación para uso foliar en cada cultivo. Aplicaciones al suelo deben ser usadas solas y NO juntas con las aplicaciones foliares recomendadas para este producto.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA. *Agitar el envase fuertemente* antes de usarlo. Verter el producto a través de un filtro al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN TANQUE/CO-APLICACION

Lea con mucha atención TODAS las etiquetas y cumpla estrictamente con las instrucciones de uso y los consejos con referencia a si el/los producto/s debería/n ser coaplicados. Existen muchas variables, que quedan fuera del control de Yara, que pueden influir en el rendimiento de los productos coaplicados, por lo que la mezcla ocurre a riesgo del usuario final. Se recomienda con insistencia que al utilizar mezclas de productos desconocidos se realice una aplicación limitada inicialmente. Antes de coaplicar productos Vd. O su asesor deberán visitar www.tankmix.com para consultar información importante. Si no, diríjase a Yara para solicitar consejos específicos.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuada al manejar este producto. Limpie todo el equipo después del uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C).

CONDICIONES DE VENTA – GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Yara garantiza que el producto en el recipiente sin abrir cumple con la descripción química indicada en esta etiqueta. Deben seguirse con mucha atención las instrucciones de esta etiqueta, las cuales se basan en pruebas que se consideran fiables. Puesto que las condiciones meteorológicas/de la tierra inusuales y el uso de este producto quedan fuera del control de Yara, no se da garantía explícita o implícita a los efectos de dicho uso ni de los resultados obtenidos, y en ningún caso la responsabilidad de Yara superará el precio del producto usado. El comprador deberá asumir todos los riesgos de almacenamiento, uso o aplicación de este producto. Los productos se venden sujetos a las condiciones de venta normales de Yara; disponibles a petición del cliente. El uso del producto implica que el comprador acepta estas Condiciones de venta.