

YaraVita Brassirel™ Pro

DK

DOSERING OG UDBRINGNING

Raps: 3 til 4 l/ha på 4 til 9 bladstadiet og igen ved begyndende strækning og indtil begyndende blomstring. Gentag behandlingen med 10 til 14 dages mellemrum, når der opstår et behov i de anførte vækststadier. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha

Ærter, Bønner: Op til 4 l/ha så tidligt som muligt i vækstsæsonen, forudsat der er tilstrækkelig bladdække til at opfange sprøjtevæsken (f.eks. 4 til 6 blade). Gentages efter behov med 10 til 14 dages mellemrum og indtil en måned før høsten. N.B. Må ikke udsprøjtes under blomstringen. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

Gulerødder: To tildelinger med 3 l/ha, når afgrøden er 15 cm høj og igen 2 uger senere. Anbefalet vandmængde 200 l/ha.

Hør: 3 l/ha når afgrøden er 15 cm høj. Ved moderat til svær mangel gentages behandlingen med 10 til 14 dages mellemrum. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

Kål, broccoli, rosekål, blomkål: 3 til 4 l/ha så tidligt i vækstsæsonen som muligt, forudsat der er tilstrækkelig bladdække til at opfange sprøjtevæsken (f.eks. 4 til 6 blade). Gentag behandlingen efter behov med 10 til 14 dages mellemrum indtil en måned før høsten. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

Sukkerroer: 3 l/ha på 4 til 6 bladstadiet. Ved moderat til svær mangel gentages behandlingen med 10 til 14 dages mellemrum. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.

BRUGSANVISNING

FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE PÅ ETIKETTEN.

Ryst beholderen grundigt før brug. Fyld tanken tre fjerdedele med vand og hæld produktet under omrøring gennem påfyldningsudstyret eller sien ned i tanken. Fyld helt op med vand og fortsæt omrøringen indtil sprøjten er tom.

TANKBLANDING / UDSPRØJTNING AF PRODUKTER

Læs samtlige etiketter omhyggeligt og følg nøje brugsanvisningen om råd og vejledning i, hvorvidt produktet(erne) kan blandes. Mange forhold, som Yara ikke har indflydelse på, kan påvirke resultatet når produktet(erne) blandes og tildeles. Som følge heraf er blanding og spredning af produkterne alene slutbrugers ansvar. Det henstilles til, at der først blandes en begrænset mængde, når der anvendes produktblandinger, som der ikke allerede er erfaring med. *Før du blander produkter, kan du også hente vigtige informationer på www.tankmix.com eller kontakte Yara Danmark Gødning A/S.*

FORHOLDSREGLER

Må kun anvendes på afgrøder, der er anført på etiketten. Undgå anvendelse under ekstreme klimatiske forhold, f.eks. hurtigtorrende forhold, kraftig dugforekomst, frost, regn, eller hvis der er udsigt til frost eller regn. Brug egnede værnemidler så som handsker og ansigtsskærm ved håndtering af dette produkt. Rens alt udstyr før og efter brug.

OPBEVARING

Opbevares på et køligt og tørt lager, utilgængeligt for børn og husdyr. Beskyt mod frost og høje temperaturer. (Ikke over 40°C)

SALGSBETINGELSER - BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR

Yara garanterer, at produktet i uåbnet emballage er i overensstemmelse med den kemiske betegnelse på denne etiket. Retningslinjerne på denne etiket skal følges nøje, og er baseret på forsøg og tests, som anses for at være pålidelige. Hvis der forekommer usædvanlige vejrforhold eller jordbundsforhold i forbindelse med brug af dette produkt, som Yara ikke har indflydelse på, ydes der ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, på den opnåede effekt af blandingen (efter et sådant brug) eller på slutresultatet. Yara kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for den del, der overstiger produktets pris. Køberen skal påtage sig alle risici ved opbevaring, blanding eller anvendelse af dette produkt. Varer sælges underlagt Yaras standardbetingelser for salg, som er tilgængelig på anmodning. Anvendelse af produktet indebærer, at køberen accepterer disse salgsbetingelser.



YaraVita Brassitrel™ Pro

FI

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA AJOITUS

Kaalit, Lanttu, Salaatti (avomaa): 3-4 l/ha niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista, kuitenkin niin että lehtipinta-ala riittävän suuri (4-6 lehtiasteella). Käsittely uusitaan tarvittaessa 10-14 vuorokauden välein. Viimeinen käsittely viimeistään 1 kuukausi ennen sadonkorjuuta. Vesimäärä: 200 l/ha.

Öljykasvit: 3 l/ha 4-9 lehtiasteella ja toista käsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein kukintaan asti. Tarvittaessa voidaan antaa 3 l/ha myös terälehtien pudottua. Vesimäärä 200 l/ha.

Peruna: 3 l/ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen ja toinen käsittely 10-14 vuorokauden kuluttua. Vesimäärä: 200 l/ha.

Porkkana: 3 l/ha. Ensimmäinen käsittely kun kasvuston korkeus on 15cm. Toinen käsittely 2 viikon kuluttua. Vesimäärä 200 l/ha.

Purjo: 3 l/ha 2 viikkoa istutuksen jälkeen tai suorakylvössä kun kasvusto on 15 cm korkea. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutuksessa tarvittaessa yksi tai kaksi uusintakäsittelyä 10-14 vuorokauden välein. Vesimäärä: 200 l/ha.

Herne ja Pavut: 3-4 l/ha niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista, kuitenkin niin että lehtipinta-ala riittävän suuri (4-6 lehtiasteella). Käsittely uusitaan tarvittaessa 10-14 vuorokauden välein. Viimeinen käsittely viimeistään 1 kuukausi ennen sadonkorjuuta. HUOM. Älä ruiskuta kukinnan aikaan. Vesimäärä: 200 l/ha.

Sipuli: 3l/ha. kaksi käsittelyä. Ensimmäinen käsittely kun lehtipinta-ala riittävän suuri (6-lehtiasteella). Toinen käsittely kahden viikon kuluttua. Vesimäärä: 200 l/ha.

Viljat: 3 l/ha 2-lehtiasteelta 1-solmuasteelle saakka. (Zadoks G.S. 12-31). Vesimäärä: 200 l/ha.

KÄYTTÖOHJEET

NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.

Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliö suodattimen läpi vedellä, kolme neljäsosaa tarvittavasta vesimäärästä, sekoitaan samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKKISEOKSET/YHTEISKÄYTTÖ

Lue KAIKKI etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita täsmällisesti, äläkä sekoita tuotteita jotka eivät sovellu yhteiskäyttöön. Monet sekoitukset, jotka ovat Yaran kontrollin ulkopuolella, voivat vaikuttaa sekoitettujen tuotteiden tehoon ja siksi niiden yhteiskäyttö on kokonaan loppukäyttäjän omalla vastuulla. On erittäin suositeltavaa tehdä ensin pienempi rajoitettu sekoitus, kun kyseessä on käyttäjälle tuntemattomat seosyhdistelmät. Ennen tankkiseoksen tekemistä tarkista oleellisia tietoja www.tankmix.com tai ota yhteyttä Yaran neuvontaan.

TURVAOHJEET

Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa. Käytä sopivia käsineitä ja kasvosuojainta käsitellessäsi tätä tuotetta. Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön.

VARASTOINTI

Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa jäätymiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta. (lämpötila yli 40°C).

MYNTIEHDOT – LAATUTAKUU JA VASTUUT

Yara takaa, että avaamattomassa pakkauksessa oleva tuote vastaa kemialliselta laadultaan tässä etiketissä olevia tietoja. Etiketissä olevia käyttöohjeita tulee noudattaa huolellisesti ja ne perustuvat tuotettaviin pidettäviin testeihin. Koska Yaralla ei ole mahdollisuutta valvoa epätavallisia sääolosuhteita, maan kuntoa tai tämän tuotteen käyttöä, mitään takuuta, nimenomaista tai johdettua, ei voida antaa käytön tai saavutettujen tuloksien suhteen, eikä Yaran vastuu missään tapauksessa ylitä käytetyn tuotteen hintaa vastaavaa summaa. Tuotteet myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka ovat saatavilla pyynnöstä tai www.yaravita.com. Käyttämällä Tuotteita käyttäjä hyväksyy nämä myyntiehdot.

NO



YaraVita Brassirel™ Pro

NO

DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT

Raps/rybs: 300 til 400 ml/daa på 4 til 9 blad stadiet og igjen ved begynnende strekning og inntil begynnende blomstring. Gjenta behandlingen med 10 til 14 dagers mellomrom etter behov.

Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Erter, bønner: Inntil 400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjentas etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting.

N.B. Må ikke sprøytes under blomstring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Gulrot: To tildelinger med 300 ml/daa, når kulturen er 15 cm høy, behandlingen gjentas etter 2 uker. Anbefalt vannmengde 20 l/daa.

Kål, brokkoli, rosenkål, blomkål: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Purre: 300 ml/daa tildeles to uker etter planting eller i tilfelle direkte såing, når kulturen er 15 cm høy. For moderat til kraftig mangel er en eller to gjentatte behandlinger nødvendig med 10-14 dagers mellomrom. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

BRUKSANVISNING

Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten. Vend kannen før bruk. Fyll tanken $\frac{3}{4}$ full med vann. Tilfør deretter produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under omrøring. Fyll på med vann og fortsett å røre til sprøytingen er ferdig. Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast.

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER

Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger om hvorvidt produktet/produktene kan brukes sammen med andre. Mange faktorer som kan virke inn på produktenes effekt ved samsprøyting ligger utenfor Yaras kontroll. Av den grunn må samsprøyting gjøres på brukerens egen risiko. Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å bruke en produktblanding en ikke har erfaring med. Før samsprøyting av produkter, bør man sjekke den fysiske blandbarheten på www.yara.no.

FORSIKTIGHETSREGLER

Unngå sprøyting under ekstreme værforhold, for eksempel ved sterk tørke, frost, regn eller hvis det ventes frost eller regn. Bruk egnede hansker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres. Alt utstyr skal rengjøres før og etter bruk. HMS-datablad for produktet finnes på www.yara.no

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier og som er utilgjengelig for barn og husdyr. Må beskyttes mot frost og ekstreme værforhold (temperaturer over 40°C).

GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Yara garanterer at produktet i den uåpnede emballasjen stemmer med den kjemiske spesifikasjonen på etiketten. Ettersom værforhold, jordsmonn samt hvordan produktet anvendes ligger utenfor Yaras kontroll, er bruker selv ansvarlig for eventuell risiko i forbindelse med lagring eller bruk av dette produktet.

SE



YaraVita Brassitrel™ Pro

SE

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING

Oljevaxter: 3 l/ha från 4-bladstadiet till början av stjälksträckning. Vid stark brist upprepa efter 10-14 dagar. Undvik behandling under blomningen. Vattenmängd 200 l/ha.

Kälvaxter: 3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten, förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm högt som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Jordgubbar friland: 3 l/ha. Behandla de nya bladen på våren och upprepa 10 till 14 dagar senare, endast före blomningen. Vattenmängd: 200 l/ha.

BRUKSANVISNING

FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka dunken ordentligt före användning.

Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten långsamt under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen.

TANKBLANDNING/SAMAPPLICERING

Läs ALLA etiketter noggrant och följ bruksanvisningen exakt, tillsammans med råd om huruvida produkten/produkterna får samappliceras. Många faktorer, som Yara inte har inflytande över, kan påverka hur samapplicerade produkter fungerar. Samapplicering görs därför helt på slutanvändarens egen risk. Vi rekommenderar starkt att en begränsad applicering görs när okända produktblandningar används för första gången. Innan produkterna samappliceras måste du, eller din rådgivare, besöka www.tankmix.com för viktig information. Du kan också kontakta Yara för specifika råd.

VARNING

För användas på skyddade grödor endast om detta specificeras. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning.

FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden. (Temperaturer över 40°C)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Yara garanterar att produkten i öppnad förpackning överensstämmer med den kemiska beskrivningen på etiketten. Anvisningarna på etiketten måste följas noggrant och bygger på tester som tros vara tillförlitliga. Eftersom Yara inte har kontroll över ovanliga väder- eller jordförhållanden, eller användningen av den här produkten, utfärdas inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, i fråga om effekterna av sådan användning eller de resultat som uppnås. Under inga omständigheter skall Yara ansvarsskyldighet överstiga priset av den produkt som används. Köparen måste själv åta sig alla risker vad gäller förvaring, användning eller applicering av produkten. Produkten säljs enligt standard villkoren för försäljning hos Yara; Villkoren kan beställas. Genom att använda produkten godkänner köparen dessa försäljningsvillkor.