

# YaraVita™ OPTIMARIS™

## DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**Aguate, Albaricoquero, Arándano, Cerezo, Ciruelo, Fresa, Granado, Higuera, Lichí, Mango, Manzano, Melón, Melocotonero, Nectarino, Peral, Piña, ; 2 - 3 l / ha.** Aplicar 4-5 tratamientos que cubran las etapas críticas de desarrollo, como la etapa de desarrollo vegetativo, a la caída de pétalos y al principio de la formación del fruto. Las dosis de aplicación deben ajustarse según el tamaño de la planta y el área foliar. Use suficiente agua para una buena cobertura de rociado. La concentración máxima para aplicaciones foliares es de 500 ml por 100 litros de agua.

**Almendro: 2 - 3 l / ha.** Aplicar 4-5 tratamientos que cubran las etapas críticas de crecimiento, como la etapa de desarrollo vegetativo, a la caída de pétalos y al principio de la formación del fruto. Las dosis de aplicación deben ajustarse según el tamaño de la planta y la superficie foliar. Use suficiente agua para una buena cobertura de rociado. La concentración máxima para aplicaciones foliares es de 500 ml por 100 litros de agua.

**Cítricos: 2 - 3 l / ha.** Aplicar 4-5 tratamientos que cubran las etapas críticas de desarrollo, como la etapa de desarrollo vegetativo, a la caída de pétalos y al principio de la formación del fruto. Las dosis de aplicación deben ajustarse según el tamaño de la planta y la superficie foliar. Use suficiente agua para una buena cobertura de rociado. La concentración máxima para aplicaciones foliares es de 500 ml por 100 litros de agua.

**Col, Coles de Bruselas, Coles, Coliflor, Kale: 1 - 2,5 l/ha.** Aplique 3-4 tratamientos en intervalos de 10 a 15 días según sea necesario. Inicie las aplicaciones 10 días después de la emergencia de las plántulas o desde la etapa de 3-4 hojas. Volumen de agua: 200 l / ha mínimo

**Olivo: 2 - 3 l / ha.** Aplicar 4-5 tratamientos que cubran las etapas críticas de desarrollo, como la etapa de desarrollo vegetativo, a la caída de pétalos y al principio de la formación del fruto. Las dosis de aplicación deben ajustarse según el tamaño de la planta y la superficie foliar. Use suficiente agua para una buena cobertura de rociado. La concentración máxima para aplicaciones foliares es de 500 ml por 100 litros de agua.

**Remolacha: 1 - 2,5 l / ha.** Aplicar 2-3 tratamientos en intervalos de 10-15 días. Comience las aplicaciones cuando las raíces o los tubérculos comiencen a desarrollarse. Volumen de agua: 200 l / ha mínimo

**Uva (mesa): 2 - 3 l / ha.** Aplicar 4-5 tratamientos que cubran las etapas críticas de desarrollo, como la etapa de desarrollo vegetativo, fin de la floración y al principio de la formación del fruto. Las dosis de aplicación deben ajustarse según el tamaño de la planta y la superficie foliar. Use suficiente agua para una buena cobertura de rociado. Volumen de agua: 200 l / ha mínimo

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

## SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

## MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

## PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climáticas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

## CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.