

YaraVita Mantrac™ Pro

KÄYTTÖOHJEET

FI

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA AJOITUS

Viljat: 1-2 l/ha, 2-lehtiasteella 2-solmuasteelle saakka (Zadoks 12-32). Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 7-14 päivän välein (Zadoks 33 - 49). Vesimäärä 200 l/ha. Tarvittaessa 0,25 l/ha 3-solmuvaiheesta ensimmäisten vihneiden esilletulon saakka.

Peruna: 1-2 l/ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän välein. Lisäksi 1 l/ha lehtiurinaalyyisin perusteella mukulanmuodostuksen aikaan. Vesimäärä 200 l/ha.

Sokerijuurikas: 1-2 l/ha 4-6 lehtiasteella. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha.

Mansikka (avomaa): 1 l/ha nuppuvaiheessa. Käsitteily toistetaan tarvittaessa 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200-500 l/ha. **Vaihtoehtoisesti:** 1-2 l/ha raakkilevaiheessa. Vesimäärä 200 l/ha.

Pensasmustikka: 2 l/ha terälehtien putoamisen aikaan. Vesimäärä 200 l/ha.

BEHANDLINGSTIDPUNKT

Spannmål: 1-2 l/ha i 2-bladstadiums början till 2. nods stadium (Zadoks 12-32). Vid måttlig eller svår näringsämnesbrist ges upprepad behandling med 7-14 dagars mellanrum (Zadoks 33-39). Vattenmängd 200 l/ha. Vid behov 0,25 l/ha i 3. nods stadium till borsten börjar synas.

Potatis: 1-2 l/ha efter fullständig groning . Vid måttlig eller svår näringsämnesbrist ges upprepad behandling med 10-14 dagars mellanrum. Eller, 1 l/ha enligt bladanalys under knörens tillväxt, vattenmängd 200 l/ha.

Sockerbetor: 1-2 l/ha vid 4-6 bladstadiet. Vid måttlig eller svår näringsämnesbrist ges upprepad behandling med 10-14 dagars mellanrum. Vattenmängd 200 l/ha.

Jordgubbe (friländ): 1 l/ha på grön blomknopp. Upprepad behandling med 10-14 dagars mellanrum vid behov.

Vattenmängd 200-500 l/ha. Alternativt: 1-2 l/ha på grön blomknopp. Vattenmängd 200 l/ha.

Blåbär: 2 l/ha under blomblads fällning. Vattenmängd 200 l/ha.

NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.

Ravinta tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliö suodattimen läpi vedellä, kolme neljäsosaa tarvittavasta vesimäärästä, sekoitetaan samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKKISEOKSET/YHTEISKÄYTTÖ

Lue KAIKKI etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita täsmällisesti, äläkä sekoita tuotteita jotka eivät sovellu yhteiskäyttöön. Monet sekoitukset, jotka ovat Yaran kontrollin ulkopuolella, voivat vaikuttaa sekoitettujen tuotteiden tehoon ja siksi niiden yhteiskäyttö on kokonaan loppukäyttäjän omalla vastuulla. On erittäin suositeltavaa tehdä ensin pienempi rajoitettu sekoitus, kun kyseessä on käyttäjälle tuntemattomat seosyhdistelmät. Ennen tankkiseoksen tekemistä tarkista oleellisia tietoja www.tankmix.com tai ota yhteyttä Yaran neuvontaan.

TURVAOHJEET

Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti muuttuvissa olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa. Käytä sopivia käsineitä ja kasvosuojainta käsitellessäsi tätä tuotetta. Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön.

VARASTOINTI

Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa, lästen ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa jäätymiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta. (lämpötila yli 40°C).

MIYNTIEHDOT – LAATUTAKUU JA VASTUUT

Yara takaa, että avaamattomassa pakkauksessa oleva tuote vastaa kemialliselta laadultaan tässä etiketissä olevia tietoja. Etiketissä olevia käyttöohjeita tulee noudattaa huolellisesti ja ne perustuvat luotettaviin pidettäviin testeihin. Koska Yaralla ei ole mahdollisuutta valvoa epätavallisia sääolosuhteita, maan kuntoa tai tämän tuotteen käyttöä, mitään takuuta, nimenomaista tai johdettua, ei voida antaa käytön tai saavutettujen tuloksien suhteen, eikä Yaran vastuu missään tapauksessa ylitä käytetyn tuotteen hintaa vastaavaa summaa. Tuotteet myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka ovat saatavilla pyynnöstä. Käyttämällä Tuotteita käyttäjä hyväksyy nämä myyntiehdot.



5

SE NO DK



YaraVita Mantrac™ Pro

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING

Dosering vid olika utvecklingsstadier/behandlingsstidpunkter.

Spannmål: 0,5-1,0 l/ha i 3-bladsstadiet till 2-nodsstadiet (Stad. 13-32). 1,5-2,0 l/ha vid stark brist. Upprepa behandlingen efter 8-12 dagar. 0,5-1,5 l/ha i höstsäd redan på hösten kan vara motiverat. Vattenmängd 100-200 l/ha.

Oljevaxter: 0,5-1,0 l/ha från 4-bladstadiet t.o.m. stjärklsträckningen. Behandling kan dock göras fram till att knopparna är synliga men ej utslagna. Undvik behandling efter begynnande blomning. 0,5-1,0 l/ha i 4-8 bladsstadiet i höstoljevaxter på hösten kan vara motiverat. Vattenmängd 150-200 l/ha.

Sockerbetor: 1,0 - 2,0 l/ha när betorna har 4-8 blad. Vid stark brist upprepa behandlingen efter 8-12 dagar. Vattenmängd 100-200 l/ha.

Potatis: 0,5-1,0 l/ha vid de 3-4 första behandlingarna mot bladmögel (då manganfria bladmögemedel används). Behandla med 10 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Ärtor, Bönor: 0,5-1,0 l/ha från 4-6 blad (10 cm-15 cm höjd) till begynnande blomning. Vattenmängd 150-200 l/ha.

Majs: 1 l/ha vid 4-6 blad. Vid tydlig till svår brist, upprepa behandling efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Grönnytor, Vallar: 0,5-1,0 l/ha tidig vår när tillväxten startat. Vid stark brist upprepas behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Jordgubbar: 1,0 l/ha i tidigt knoppstadium. Vattenmängd 200-500 l/ha.

Kälvaxter: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladtyta. Upprepa behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200-500 l/ha.

Lök: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladtyta. Upprepa behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladtyta. Upprepa behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Purjolök: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladtyta. Upprepa behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Sallad (friland): 0,8-1,0 l/ha tillförs så snart det finns en tillräcklig bladtyta. Upprepa behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 500 l/ha.

Äpple, Päron: 1,0-1,5 l/ha från knoppsprickning till ballongstadiet, samt då blombladen faller. Upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd 500-1000 l/ha.

BRUKSANVISNING

FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillförl produkten genom påfyllningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående. Lärna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen.

TANKBLANDNING/SAMAPPLICERING

Läs ALLA etiketter noggrant och följ bruksanvisningen exakt, tillsammans med råd om huruvida produkten/produkterna får samappliceras. Många faktorer, som Yara inte har inflytande över, kan påverka hur samapplikerade produkter fungerar. Samapplicering görs därför helt på slutanvändarens egen risk. Vi rekommenderar starkt att en begränsad applicering görs när okända produktblandningar används för första gången. Innan produkterna samappliceras måste du, eller din rådgivare, besöka www.tankmix.com för viktig information. Du kan också kontakta Yara för specifika råd.

VARNING

Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning.


FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden. (Temperaturer över 40°C).

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Yara garanterar att produkten i öppnad förpackning överensstämmer med den kemiska beskrivningen på etiketten. Anvisningarna på etiketten måste följas noggrant och bygger på tester som tros vara tillförlitliga. Eftersom Yara inte har kontroll över ovanliga väder- eller jordförhållanden, eller användningen av den här produkten, utfärdas inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, i fråga om effekterna av sådan användning eller de resultat som uppnås. Under inga omständigheter skall Yara ansvarsskyldighet överstiga priset av den produkt som används. Köparen måste själv äta sig alla risker vad gäller förvaring, användning eller applicering av produkten. Produkten säljs enligt standardvillkoren för försäljning hos Yara. Villkoren kan beställas. Genom att använda produkten godkänner köparen dessa försäljningsvillkor.

SE



5

YaraVita Mantrac™ Pro

DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT

Eple/pære: 100 - 150 ml i 20-100 l vann/daa. Før blomstring ved stor fare for mangel, ellers etter avblomstring. Kan gjentas etter 10-14 dager. På korkrust-utsatte sorter settes behandling til 6 uker etter avblomstring.

Erter/bønner: 100 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell manganmangel. 100-150 ml/daa ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarging.

Jordbær: 100 ml i 20-50 l vann/daa på grønn knopp. Ved behov gjentas behandling etter 10-14 dager.

Alternativ: 100-200 ml i 20 liter vann/daa på grønn knopp.

Korn: 100-200 ml i 3 5 til 20 l vann/daa fra 2.-bladstadiet til 2. lLeddknute synlig (Zadoks 's G.S. 12 til 32). Ved moderate til sterke mangler gjenta behandlingen med 7 til 14 dagers intervaller.

Oljvekster: En gangs sprøyting, 100 ml i 20 l vann/daa ved begynnende stengelstrekning. Ved moderate til sterke mangler, 100 ml/daa fra 4-6 bladstadiet fram mot begynnende stengelstrekning. Sprøytingen gjentas med 10 til 14 dagers intervaller. Unngå sprøyting under blomstringen.

Potet: 100-200 ml i 20 liter vann/daa fra en uke etter full oppspiring. Ved moderat til sterk mangel, gjenta sprøytingen med 10-14 dagers intervall.

BRUKSANVISNING

Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten. Vend kannen før bruk. Fyll tanken $\frac{3}{4}$ full med vann. Tilfør deretter produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under omrøring. Fyll på med vann og fortsett å røre til sprøytingen er ferdig. Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast.

NO

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER

Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger om hvorvidt produktet/produktene kan brukes sammen med andre. Mange faktorer som kan virke inn på produktenes effekt ved samsprøyting ligger utenfor Yaras kontroll. Av den grunn må samsprøyting gjøres på brukerens egen risiko. Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å bruke en produktblanding en ikke har erfaring med. Før samsprøyting av produkter, bør man sjekke den fysiske blandbarheten på www.yara.no.

FORSIKTIGHETSREGLER

Unngå sprøyting under ekstreme værforhold, for eksempel ved sterk tørke, frost, regn eller hvis det ventes frost eller regn. Bruk egnede hansker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres. All utstyr skal rengjøres før og etter bruk. HMS-datablad for produktet finnes på www.yara.no

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier og som er utlignelig for barn og husdyr. Må beskyttes mot frost og ekstreme værforhold (temperaturer over 40°C).

GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Yara garanterer at produktet i den uåpnede emballasjen stemmer med den kjemiske spesifikasjonen på etiketten. Ettersom værforhold, jordsmonn samt hvordan produktet anvendes ligger utenfor Yaras kontroll, er bruker selv ansvarlig for eventuell risiko i forbindelse med lagring eller bruk av dette produktet.



5



YaraVita Mantrac™ Pro

DOSERING OG UDBRINGNING

Vårsæd: 0,5 - 1 l/ha fra stadie 12-32 (2 blade til 2.knæ). Ved kraftig mangel: 1,5-2 l/ha. Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10 - 14 dage. Vandmængde: 100-200 l/ha. Vintersæd: 0,5-1,0 l/ha i efteråret fra stadie 12 (2 blade). I foråret 0,5 - 1,0 l/ha fra stadie 12-32 (2 blade til 2.knæ). Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10 - 14 dage. Vandmængde: 100-200 l/ha.

Majs: 1 l/ha når majsen har 4-6 blade. Ved udpræget mangel gentages behandlingen efter 10-14 dage. Vandmængde: 200 l/ha.

Kartofler: 1-2 liter pr ha fra en uge efter fremspiring. Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10 - 14 dage. Vandmængde: 100 - 200 l/ha.

Sukkerroer: 1,0 - 2,0 l/ha når roerne har 4-8 blad. Ved udpræget mangel gentages behandlingen efter 8-12 dage. Vandmængde 100-200 l/ha.

BRUGSANVISNING

FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE PÅ ETIKETTEN.

Ryst beholderen grundigt før brug. Fyld tanken tre fjerdedele med vand og hæld produktet under omrøring gennem påfyldningsudstyret eller sien ned i tanken. Fyld helt op med vand og fortsæt omrøringen indtil sprøjten er tom.

TANKBLANDING / UDSPRØJTNING AF PRODUKTER

Læs samtlige etiketter omhyggeligt og følg nøje brugsanvisningen om råd og vejledning i, hvorvidt produktet(erne) kan blandes. Mange forhold, som Yara ikke har indflydelse på, kan påvirke resultatet når produktet(erne) blandes og tildedes. Som følge heraf er blanding og spredning af produkterne alene slutbrugerens ansvar. Det henstilles til, at der først blandes en begrænset mængde, når der anvendes produktblandinger, som der ikke allerede er erfaring med. *Før du blander produkter, kan du også hente vigtige informationer på www.tankmix.com eller kontakte Yara Danmark Gødning A/S.*

FORHOLDSREGLER

Må kun anvendes på afgrøder, der er anført på etiketten. Undgå anvendelse under ekstreme klimatiske forhold, f.eks. hurtigtværende forhold, kraftig dugforekomst, frost, regn, eller hvis der er udsigt til frost eller regn. Brug egnede værnemidler så som handsker og ansigtsskærm ved håndtering af dette produkt. Rens alt udstyr før og efter brug.

OPBEVARING

Opbevares på et køligt og tørt lager, utilgængeligt for børn og husdyr. Beskyt mod frost og høje temperaturer. (Ikke over 40°C)

SALGSBETINGELSER - BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR

Yara garanterer, at produktet i

uåbnetemballage er i overensstemmelse med den kemiske betegnelse på denne etiket. Retningslinjerne på denne etiket skal følges nøje, og er baseret på forsøg og tests, som anses for at være pålidelige. Hvis der forekommer usædvanlige vejrforhold eller jordbundsforhold i forbindelse med brug af dette produkt, som Yara ikke har indflydelse på, ydes der ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, på den opnåede effekt af blandingen (efter et sådant brug) eller på slutresultatet. Yara kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for den del, der overstiger produktets pris. Køberen skal påtage sig alle risici ved opbevaring, blanding eller anvendelse af dette produkt.

Varer sælges undertaget Yaras standardbetingelser for salg, som er tilgængelig på anmodning. Anvendelse af produktet indebærer, at køberen accepterer disse salgsbetingelser.

DK

