



YaraVita™
Zintrac™ 700



1 λίτρο
καθαρού
βάρους
1.73 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

Λίπασμα ΕΚ

Οξειδίο του ψευδαργύρου λιπασμάτων αναστολή

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνει κατά υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Εγγυημένη ανάλυση:

40% = 700 γραμ./λίτρο ψευδάργυρος (Zn) ολικός

Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK Tel: 01759 302545 Fax: 01759 303650
Διανέμεται από: Yara Ελλάς Α.Ε. Λ. Συγγρού 143, 171 21 Νέα Σμύρνη Τηλ.: 210 9370355 Fax: 210 9370357
www.yara.com
Lambrou Agro Ltd, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus
T: 357 22667908 F: 357 22667157
www.lambrouagro.com.cy



Προσοχή

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σιτηρά: 50 – 100 ml/στρέμμα από το στάδιο των 2 φύλλων έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (κλίμακα Zadok 12 έως 31), με μία ή δύο επαναληψιμίες ανά 10-14 ημέρες σε περιπτώσεις μέτριας προς σοβαρής ανεπάρκειας. Ποσότητα νερού: 5 έως 20 λίτρα/στρέμμα.

Καλαμπόκι: 100 ml/στρέμμα από το στάδιο των 3 - 8 φύλλων. Σε περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας, επαναληπτικές εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες. Ποσότητα νερού: 3 έως 20 λίτρα/στρέμμα.

Ρύζι: 100 ml/στρέμμα κατά την έναρξη του αδελφώματος και εκ νέου κατά την αρχή εμφάνισης της φύβης.

Ποσότητα νερού: 3 έως 20 λίτρα/στρέμμα.

Φασόλια: 50 – 100 ml/στρέμμα όταν το φυτό έχει ύψος 5 έως 15 εκ.

Ποσότητα νερού: 3 έως 20 λίτρα/στρέμμα.

Πατάτες: 100ml/στρέμμα μία εβδομάδα μετά το πλήρες φύτρωμα. Σε περιπτώσεις μέτριας έως σοβαρής ανεπάρκειας, ενδέχεται να χρειαστούν επαναληπτικές εφαρμογές ανά 10- 14 ημέρες. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 5 λίτρα/στρέμμα.

Ντομάτες (υπαίθρια καλλιέργεια): 30-100 ml/στρέμμα στο στάδιο των 4 - 6 φύλλων. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 7 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι (σταφύλια οινοπαιας και επιτραπέζια): 100 ml/στρέμμα κατά την εμφάνιση των μπουμπουκιών και εκ νέου κατά την καρποδέση.

Ελάχιστη ποσότητα νερού: 20 λίτρα/στρέμμα.

Καρπούζια (υπαίθρια καλλιέργεια): 50 ml/στρέμμα. Τρεις εφαρμογές στις 15, 30 και 45 ημέρες μετά το φύτευμα.

Ποσότητα νερού: 50 λίτρα/στρέμμα.

Βαμβάκι: 50-100 ml/στρέμμα, 3 έως 4 εβδομάδες μετά το φύτευμα.

Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10-14 ημερών.

Ελάχιστη ποσότητα νερού: 5 λίτρα/στρέμμα.

Καπνός: 100 ml/στρέμμα, δύο με τρεις εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση (στάδιο 3 - 4 φύλλων). Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε έπειτα από 10 ημέρες. Ποσότητα νερού: 50 λίτρα/στρέμμα.

Κολοκυθάκια, Αγγούρια (υπαίθρια καλλιέργεια): 30-100ml/στρέμμα κατά το στάδιο των 2 - 4 φύλλων. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10-14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 5 λίτρα/στρέμμα.

Ακρόρρυα (φυλλοβόλα): 100 ml/στρέμμα κατά την έκπτυξη των σφραγισμάτων την άνοιξη. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε έπειτα από 10-15 ημέρες. Ποσότητα νερού: 50 έως 100 λίτρα/στρέμμα.

Μήλα: 50-100 ml/100 λίτρα νερό (μέγιστη δόση 200 ml/στρέμμα) κατά την έκπτυξη των σφραγισμάτων καθώς και στο τέλος της ανθοφορίας.

Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. (Στις ελαστικές στη σκωριόχρωση ποικιλίες αποφεύγετε τις εφαρμογές μετά την ανθοφορία και περιμένετε έως 6 εβδομάδες μετά την πτώση των πετάλων). Μία ακόμη εφαρμογή μπορεί να γίνει μετά τη συγκομιδή, αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων.

Μέγιστη ποσότητα νερού: 200 λίτρα/στρέμμα.

Βερικόκα, Κεράσια, Ροδάκινα, Νεκταρίνα: 100 – 200 ml/στρέμμα κατά το στάδιο των χειμερινών σφραγισμάτων και εκ νέου κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής. 100 – 200 ml/στρέμμα μετά τη συγκομιδή αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων.

Ποσότητα νερού: 50 έως 100 λίτρα/στρέμμα.

Εσπεριδοειδή: 100-200 ml/στρέμμα κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης ανάπτυξης της βλάστησης και εκ νέου κατά τη φθινοπωρινή ανάπτυξη της βλάστησης. Και στις 2 περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί μια επαναληπτική εφαρμογή μετά από 10-14 ημέρες, εφόσον υπάρχει μέτρια έως σοβαρή ανεπάρκεια. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 50 λίτρα/στρέμμα (συνηθισμένη ποσότητα): 200-400 λίτρα/στρέμμα).

Ελιές: 50 ml/100 λίτρα νερό (με μέγιστη δόση 100 ml/στρέμμα) πριν από την ανθοφορία. Μέγιστη ποσότητα νερού: 200 λίτρα/στρέμμα.

Αχλάδια: 100 – 200 ml/στρέμμα κατά την έκπτυξη των σφραγισμάτων. Απαιτείται μία ακόμη εφαρμογή ποσότητας από 100 – 200 ml/στρέμμα μετά τη συγκομιδή, αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων.

Ποσότητα νερού: 20 έως 100 λίτρα/στρέμμα.

05.05.16
WILGRYP48MO1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Αναμείξτε *πολύ καλά* το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις συμβουλές για το εάν το(-α) προϊόν(-τα) μπορούν να συνδυαστούν. Πολλοί παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο της Yara, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των προϊόντων που εφαρμόζονται ταυτόχρονα και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα έγκαιρα αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Συνιστάται θερμά η πραγματοποίηση μιας περιορισμένης εφαρμογής πριν από τη χρήση άγνωστων μειγμάτων προϊόντων. Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα www.tankmix.com για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά άργες συνθήκες στεγνωματος, σε παγετό, βροχή ή όταν ανασταίνεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό ή ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προσταψίτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C).

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Yara εγγυάται ότι το προϊόν εντός της σφραγισμένης συσκευασίας του συμμορφώνεται με τη χημική περιγραφή της ετικέτας. Οι οδηγίες αυτής της ετικέτας πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά και είναι βασισμένες σε ελέγχους που θεωρούνται αξιόπιστοι. Επειδή οι ασυνήθιστες καιρικές ή εδαφικές συνθήκες, καθώς και η χρήση του προϊόντος, εναι πέραν του ελέγχου της Yara, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται σε σχέση με τις επιπτώσεις της εν λόγω χρήσης ή τα αποτελέσματά της, και σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Yara δεν θα υπερβεί την τιμή του χρησιμοποιηθέντος προϊόντος. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους αποθήκευσης, χρήσης ή εφαρμογής του προϊόντος. Τα προϊόντα πωλούνται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης της Yara, οι οποίοι είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.