

# YaraVita Safe N™ 300

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Σάβρι:** 1,1 - 2,2 l/στρέμμα. Εφαρμογή από το αδέρφωμα έως το τέλος του σταδίου του γαλακτώδους καρπού κατά το γέμισμα των σπόρων (κλίμακα Zadoks G.S. 21 έως 79). Ποσότητα νερού: 10 - 20 l/στρέμμα. Προσοχή: Σημειώστε ότι όψιμες διαφυλλικές εφαρμογές αζώτου μπορούν να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε αζώτο των κόκκων των σπирών.

**Καλαμπόκι:** 1,1 - 2,2 l/στρέμμα. Εφαρμογή στο στάδιο των 4 - 6 φύλλων και επανάληψη 10 - 14 ημέρες αργότερα. Ποσότητα νερού: 10 - 20 l/στρέμμα.

**Βαμβάκι:** Εφαρμόστε 0,2 έως 0,5 λίτρα/στρέμμα στο στάδιο των 4 φύλλων. Εφαρμόστε 0,5 - 1 λίτρα/στρέμμα στο ξεκίνημα της άνθησης. Μία ή δύο επαναληπτικές εφαρμογές, εφόσον χρειάζεται, ανά διαστήματα 10 - 14 ημερών. Ποσότητα νερού: 20 λίτρα/στρέμμα.

**Ρύζι:** 1 - 2,5 l/στρέμμα. Εφαρμογή στο στάδιο των 2 - 3 φύλλων και/ή την έκπτυξη του κορυφαίου φύλλου. Ποσότητα νερού: 10 - 20 l/στρέμμα.

**Μηλοειδή:** 0,5 το 1 l/στρέμμα από την έκπτυξη των σφραγισμών έως την έναρξη της ανθοφορίας και/ή από την πτώση των πετάλων με μία επαναληπτική εφαρμογή, εφόσον χρειάζεται, 10 - 14 ημέρες αργότερα και/ή μετά τη συγκομιδή αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Ποσότητα νερού: 50 l/στρέμμα.

**Πυρηνοκάρπι:** 0,5 - 1 l/στρέμμα από την πτώση των πετάλων και επαναληπτική εφαρμογή, εφόσον χρειάζεται, 10 - 14 ημέρες αργότερα και/ή μετά τη συγκομιδή αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Ποσότητα νερού: 50 l/στρέμμα.

**Ελιά:** 0,2 - 0,5 l/στρέμμα, εφαρμογή μετά την έκπτυξη των σφραγισμών και το άνοιγμα του κάλυκα. 1 - 1,5 l/στρέμμα, εφαρμογή στο ξεκίνημα της ανάπτυξης των καρπών και επαναληψίες με βάση τις απαιτήσεις σε διαστήματα 10 - 14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 20 l/στρέμμα.

**Τομάτα (υπαίθρια):** 1 - 1,5 l/στρέμμα. Εφαρμογή κατά την καρπόδεση. Επανάληψη, εφόσον χρειάζεται, σε διαστήματα 10 - 14 ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 50 l/στρέμμα.

**Αμπέλι:** Δύο εφαρμογές στα 0,5 - 1 l/στρέμμα, σε διαστήματα 10 - 14 ημερών από την έναρξη ανάπτυξης των φύλλων έως το στάδιο του "μούρου" και/ή δύο εφαρμογές στα 0,5 - 1 l/στρέμμα σε διάστημα 10 - 14 ημερών από το ξεκίνημα της ωρίμανσης ("γυάλισμα"). Ελάχιστη ποσότητα νερού: 15 l/στρέμμα.

**Εσπεριδοειδή:** 1 - 1,5 l/στρέμμα. Εφαρμογή προ-ανθικά και επανάληψη αμέσως μετά την καρπόδεση. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 50 l/στρέμμα.

**Μαρούλι (υπαίθρια καλλιέργεια):** 1 - 1,5 l/στρέμμα. Εφαρμογή 10 - 14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση ή αραίωμα των φυτών. Επανάληψη 14 ημέρες αργότερα και 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 50 l/στρέμμα.

**Υδρολίπανση:** 1 - 1,5 l/στρέμμα. Να εφαρμόζεται μόνο του. Να διαλύεται και χρησιμοποιείται άμεσα. Ξεπλύνετε το σύστημα επισπασμένα με νερό, μετά την εφαρμογή. **ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ** το προϊόν σε "κλειστά" ή "με επανακυκλοφορία" συστήματα και να μην εφαρμόζεται σε φυτά/καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε γλάστρες/δοχεία.

Επανάλαβε τις εφαρμογές στον ίδιο αριθμό και χρόνο, ακολουθώντας τις συστάσεις των διαφυλλικών εφαρμογών, για κάθε μία από τις καλλιέργειες που αναφέρονται. Για από το προϊόν, οι εφαρμογές με υδρολίπανση πρέπει να γίνονται μόνες τους και ΟΧΙ σε συνδυασμό με τις συνιστώμενες διαφυλλικές εφαρμογές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΝΑ ΤΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

*Αναμίξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.* Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

## ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά **ΟΛΕΣ** τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις συμβουλές για το εάν το(-α) προϊόν(-τα) μπορούν να συνδυαστούν. Πολλά παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο της Yara, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των προϊόντων που εφαρμόζονται ταυτόχρονα και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα έγκαιρα αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Συνιστάται θερμά η πραγματοποίηση μιας περιορισμένης εφαρμογής πριν από τη χρήση άγνωστων μειγμάτων προϊόντων. *Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει να εστιάσει η ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.talkmix.com](http://www.talkmix.com) για σημαντικές πληροφορίες.* **Εναλλακτικά, τακτοποιήστε σε ειδικών γνώσεων ή σε ειδικούς της παροχής συγκεκριμένων συμβουλών.**

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

*Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα.* Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε ριγώρα αυξανόμενες συνθήκες ψύξης, σε εξαιρετικά άργες συνθήκες σπενταγματος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

## ΑΠΟΦΥΓΗΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. *Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό από από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C).*

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΓΥΝΗΣ

Η Yara εγγυάται ότι το προϊόν εντός της σφραγισμένης συσκευασίας του συμμορφώνεται με τη χημική περιγραφή της ετικέτας. Οι οδηγίες αυτής της ετικέτας πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά και είναι βεβαιωμένες σε ελεγχούς που θεωρούνται αξιόπιστοι. Επειδή οι ασυνήθιστες καιρικές ή εδαφικές συνθήκες, καθώς και η χρήση του προϊόντος, είναι πέραν του ελέγχου της Yara, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται σε σχέση με τις επιπτώσεις της εν λόγω χρήσης ή τα αποτελέσματά της, και σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Yara δεν θα υπερβεί την πηγή του χρησιμοποιηθέντος προϊόντος. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλους τους χρονοσυντακτικούς, χρήσης ή εφαρμογής του προϊόντος. Τα προϊόντα πωλούνται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης της Yara, οι οποίοι είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.