

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Στάγδην άρδευση: Εφαρμόστε κατά τη φύτευση και κάθε 3-4 εβδομάδες 200-500 ml/στρ.

Φρούλα: Για εφαρμογή εδάφους: Στάγδην άρδευση: Εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. μετά τη μεταφύτευση κάθε 2-3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου του φυτού.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Πεπόνι, Πιπεριά: Για εφαρμογή εδάφους - φυτώριο: Εφαρμόστε από τη σπορά έως πριν την εμφάνιση του φυτού. Δόση 200-500 ml/στρ. Για στάγδην άρδευση: Εφαρμόστε αμέσως μετά τη φύτευση και μετά κάθε 3-4 εβδομάδες. Δόση 200-500 ml/στρ. Για διαφυλλική εφαρμογή: όταν τα φυτά έχουν ύψος 10-20 εκ. εφαρμόστε 100-200 ml/στρ. Οι πιο χαμηλές δόσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται 3-4 εβδομάδες αργότερα. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

Σταφύλια (επιτραπέζια και οινοποίησης): Για εφαρμογή εδάφους μέσω συστήματος άρδευσης - υδρολίπανσης: 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Εσπεριδοειδή Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Αβοκάντο, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Μηλιά, Νεκταρίδι, Ροδακινιά: Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Ελιά: Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Ακρόδρυα: Για εφαρμογή εδάφους: Όταν ξεκινάει η βλαστική ανάπτυξη, εφαρμόστε 25-50 ml σε 30-40 lt νερό κάτω από τη φυλλική επιφάνεια του δένδρου ανάλογα του μεγέθους του. Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης - υδρολίπανσης, εφαρμόστε 200-400 ml/στρ. ανά 4 εβδομάδες.

Ρύζι: Για διαφυλλική εφαρμογή: όταν τα φυτά έχουν ύψος 20-35 εκ. εφαρμόστε 100-200 ml/στρ. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 lt/στρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομιού επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλός σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tankmix.com για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.