



YaraVita™

Crop Boost™



ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

Fertilizante Foliar

Composición Química:	p/v
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅).....	44.00%
Óxido de Potasio (K ₂ O).....	7.50%
Magnesio (MgO).....	6.70%
Zinc (Zn).....	4.60%
Ingredientes inertes.....	37.20%

Total.....100.00 %

Densidad: 1. 491 g/l

Contiene: 628 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial

Contenido neto: 1 Litro

Formulado por Yara UK Ltd., York YO42 1DN, Inglaterra
Importado y distribuido por Yara Guatemala S.A., Calzada Roosevelt 33-86 zona 7, Edificio ILUMINA oficina 1102, Guatemala

PRIMEROS AUXILIOS:
INGESTIÓN: Provoque el vómito. De a beber 2 vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzocortante.
CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.
INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje la ropa y vigile la respiración.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos por espacio de 15 minutos con agua limpia

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenar el producto alejado de fuentes de calor en un lugar seco y ventilado identifíquelo con su etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO

Arroz: Aplicar 2 l/ha (1.4 l/mz) a inicio de encañado y repetir al inicio de la formación de la panícula. Volumen de agua: 200 a 400 l/ha (140-280 l/mz).

Frijol: Aplicar 3 a 5 l/ha (2 a 3.5 l/mz) cuando el cultivo alcance 10 a 15 cms de altura. Repetir según necesidad a intervalos de 10 a 14 días.

Volumen de agua 30 a 200 l/ha (20-140 l/mz).

Maíz: Aplicar 2 a 3 l/ha (1.4 a 2.1 l/mz) a partir de 4 a 6 hojas, pudiendo repetir entre 10 a 14 días después.

Volumen de agua: 30 a 200 l/ha (20 a 140 l/mz).

Papas: Para estimular el crecimiento inicial: aplicar 3-5 l/ha (2 a 3.5 l/mz) una semana después que se ha alcanzado el 100% de la emergencia del cultivo. Para favorecer el número de tubérculos: aplicar 3-5 l/ha (2 a 3.5 l/mz) en iniciación de tubérculos (cuando el 50% de las puntas de los estolones han alcanzado un diámetro del doble del resto del estolón). Para favorecer el tamaño de los tubérculos: aplicar 5 l/ha (3.5 l/mz) durante llenado de los tubérculos (tan pronto como los primeros tubérculos formados alcanzan los 10 mm de diámetro). Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días.

Volumen de agua: 200 l/ha (140 l/mz).

28.10.16

WLGTYP32M00

País: Guatemala
No. de Registro: 352-F-4269-42
No. de Lote: Ver el envase para más detalles
Fecha de fabricación: Ver en el envase para más detalles
Fecha de Vencimiento: 5 años partir de la fecha de fabricación
Fecha de registro: 14 de Abril 2015

RECOMENDACIONES DE USO
Para potenciar el crecimiento inicial de cultivos

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y FORMA DE APLICACIÓN
Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto a través de un filtro al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN TANQUE/COAPLICACIÓN
Lea con mucha atención TODAS las etiquetas y cumpla estrictamente con las instrucciones de uso y los consejos con referencia a si el/los producto/s debería/n ser coaplicados. Existen muchas variables, que quedan fuera del control de Yara, que pueden influir en el rendimiento de los productos coaplicados, por lo que la coaplicación corre a riesgo del usuario final. Se recomienda con insistencia que al utilizar mezclas de productos desconocidos se realice una aplicación limitada inicialmente. Antes de coaplicar productos ud. O su asesor deberán visitar www.tankmix.com para consultar información importante. Si no, diríjase a Yara para solicitar consejos específicos.
Forma de Aplicación : Fertilizante de uso foliar.
Incompatibilidad : Mezclable con la mayoría de los agroquímicos para productos específicos consulte tank mix.

FITOTOXICIDAD
Este producto no es fitotóxico para las plantas cuando esta aplicado en los momentos y las dosis recomendadas en esta etiqueta. El fabricante no asume ninguna responsabilidad si el usuario no sigue las recomendaciones de esta etiqueta o cuando el producto se aplica en mezcla con otros productos en el mismo tanque.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
No apto para aplicación en plantas cultivadas por debajo invernadero de cristal o de plástico. Evitar las aplicaciones en condiciones climáticas extremas (condiciones de sequía rápida, elevada humedad permanente, heladas, lluvia) o si se esperen inmediatamente. Proteger de las heladas y temperaturas por encima de 40°C.

CONDICIONES DE VENTA – GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
Yara garantiza que el producto en el recipiente sin abrir cumple con la descripción química indicada en esta etiqueta. Deben seguirse con mucha atención las instrucciones de esta etiqueta, las cuales se basan en pruebas que se consideran fiables. Puesto que las condiciones meteorológicas/de la tierra inusuales y el uso de este producto quedan fuera del control de Yara., no se da garantía explícita o implícita a los efectos de dicho uso ni de los resultados obtenidos, y en ningún caso la responsabilidad de Yara superará el precio del producto usado. El comprador deberá asumir todos los riesgos de almacenamiento, uso o aplicación de este producto. Los productos se venden sujetos a las condiciones de venta normales; disponibles a petición del cliente. El uso del producto implica que el comprador acepta estas condiciones de venta.

Para consultas y asesoría técnica, llame al: 502 24212600 Yara Guatemala S.A.