

Primjena/doze primjene

Agumi: primijeniti u dozi 1,5-2 lit/ha prije cvatnje i nakon oplodnje. Preporučena količina vode: 500-1000 lit/ha.

Brokula, Cvjetača, Kupus, Prokulica: primijeniti u dozi 3,0 lit/ha u fazi 4-6 lista. Kod umjerenog do jakog nedostatka bora, ponoviti tretiranje nakon 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Cikla, Šećerna repa: primijeniti u dozi 3,0 lit/ha u fazi 4-6 lista.

Kod umjerenog do teškog nedostatka, ponoviti aplikaciju u navedenim dozama u intervalu 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 50-200 lit/ha.

Grah, Grašak: primijeniti u dozi 2,0 lit/ha u fazi 10-15 cm. Kod umjerenog do jakog nedostatka bora, ponoviti tretiranje nakon 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Jabuka, Kruška: primijeniti u dozi 1,0-2,0 lit/ha u fazi ružičastog pupa, u početku cvatnje i kod opadanja latica, a u dozi 2,0 lit/ha nakon berbe, a prije opadanja lista.

Preporučena količina vode: 500-1000 lit/ha.

Jagoda (uzgoj u polju): primijeniti dvije aplikacije u dozi 1,0 lit/ha u početku bijelog pupa i 14 dana kasnije. Nakon berbe za ponovni rast, primijeniti u dozi 2,0 lit/ha.

Preporučena količina vode: 200-500 lit/ha.

Krumpir: primijeniti u dozi 1,0-2,0 lit/ha jedan tjedan poslije potpunog nicanja. Druga aplikacija može se primijeniti 10-14 dana kasnije. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Luk: primijeniti u dozi 1,0 lit/ha kad biljka razvije dovoljno lisne mase da može usvojiti aplicirano hranjivo. Druga aplikacija može se primijeniti 10-14 dana kasnije.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Maslina: primijeniti u dozi 1,5-2,5 lit/ha prije cvatnje i nakon oplodnje. Preporučena količina vode: 500-1000 lit/ha.

Mrkva: primijeniti u dozi 3,0 lit/ha kod visine 10-15 cm ili kad biljka razvije dovoljno lisne mase da može usvojiti aplicirano hranjivo. Kod umjerenog do jakog nedostatka bora, ponoviti tretiranje nakon 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Šljiva, Trešnja: primijeniti u dozi 1,0-2,0 lit/ha u fazi zimskog pupa i ponovo u fazi ružičastog pupa, a u dozi 2,0 lit/ha nakon berbe, a prije opadanja lista.

Preporučena količina vode: 500-1000 lit/ha.

Uljana repica: Jednokratna aplikacija: primijeniti u dozi 3,0 lit/ha u fazi rasta stabljike. Kod umjerenog nedostatka primijeniti u dozi 3,0 lit/ha u fazi 4-6 lista i u dozi 3,0 lit/ha u fazi rasta stabljike. Dodatna aplikacija može se primijeniti 10-14 dana kasnije ili do početka cvatnje. Preporučena količina vode: 50-200 lit/ha.

Vinova loza: primijeniti u dozi 1-1,5 lit/ha prije cvatnje i nakon oplodnje. Preporučena količina vode: 500-1000 lit/ha.

Primjena putem tla: Sve kulture: primijeniti u dozi 5,0 lit/ha prije sjetve/sadnje. Preporučena količina vode: 50 lit/ha minimum, kako bi se osigurala odgovarajuća aplikacija.

Napomena: Propisane doze ne smiju se prekoračiti.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi
Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indukcijskog lijevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

TANK MIX KOMPATIBILNOST (MIJEŠANJE)

Strogo se pridržavati uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvoda pregledajte www.tankmix.com za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

UPOZORENJE

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja.

Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

SKLADIŠTENJE

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

UVJETI PRODAJE

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvaća ove uvjete prodaje.



Felhasználási javaslat.

LOMBKEZELÉS

Alma: 1-1,5 l/ha dózisban piros bimbós állapotban, a virágzás kezdetén, majd azt követően szíromhulláskor. 2 l/ha a betakarítás után, de még a levélhullás előtt. Vízmenyiség: 400-1000 l/ha.

Bab: 1,5-2 l/ha 10-15 cm-es állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmenyiség: 200-400 l/ha.

Borsó: 2 l/ha 10-15 cm-es állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmenyiség: 200-400 l/ha.

Brokkoli, Kelbimbó, Káposzta, Karalábé, Karfiol: 2 l/ha dózisban 4-6 leveles állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmenyiség: 300-500 l/ha.

Burgonya: A teljes kikelést követően 1 l/ha dózisban javasolt kezelni. 10-14 nap múlva második kezelés javasolt szintén 1 l/ha adagban. Vízmenyiség: 300-600 l/ha.

Cseresznye, Meggy, Szilva: 1 l/ha dózisban rügypattanás előtt, majd fehérbimbós állapotban még egyszer. 2 l/ha a betakarítás után, de még a levélhullás előtt. Vízmenyiség: 400-1000 l/ha.

Cukorrépa, Cékla, Takarmányrépa: 2 l/ha 4-6 leveles állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmenyiség: 300-600 l/ha.

Hagymafélék: 1 l/ha, amint a megfelelő levélfelület kialakult.

10-14 nap múlva második kezelés javasolt. Vízmenyiség: 300-600 l/ha.

Körte: 1 l/ha dózisban fehér bimbós állapotban, a virágzás kezdetén, majd azt követően szíromhulláskor. 2 l/ha a betakarítás után, de még a levélhullás előtt. Vízmenyiség: 400-1000 l/ha.

Kukorica: 2 l/ha adagban 4-8 leveles állapotban alkalmazzuk. Vízmenyiség: 200-400 l/ha.

Napraforgó: 2 l/ha, 4-6 leveles állapotban és 1 l/ha csillagbimbós állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmenyiség: 200-500 l/ha.

Repce: 2 l/ha 4-8 leveles állapotban és 1 l/ha virágzás előtt. Permetté mennyiség: 200-400 l/ha

Saláta (szabadföldi): 2 l/ha 10-14 nappal a palántázás után. Vízmenyiség: 400-600 l/ha.

Sárgarépa: 3 l/ha dózisban 10-15 cm-es állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízmenyiség: 300-500 l/ha.

Szója: 2 l/ha a növény 5-15 cm-es állapotában. Szükség esetén 10-14 naponra ismételjük meg a kezelést. Vízmenyiség: 50-200 l/ha.

Szamóca (szabadföldi): 1 l/ha dózissal fehér bimbós állapotban alkalmazzuk, majd 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Betakarítás után 2 l/ha dózissal kezeljük az állományt. Vízmenyiség: 400-600 l/ha.

Szőlő: 1,0 l/ha dózissal kezelve a fűrtvirágzat kialakulásakor, és a virágrügyek megjelenésekor. Betakarítás után 2 l/ha dózissal kezeljük az állományt. Vízmenyiség: 500-800 l/ha.

Uborka (szántóföldi termesztés): 2 l/ha a négyleveles állapottól. 10-14 naponra ismételjük, ha szükséges. 50-200 l/ha lémenyiség.

TALAJKEZELÉS: 5 l/ha ültetés vagy kelés előtt, a megfelelő vízmennyiséggel kijuttatva (50 l/ha).

Használati utasítás

Mindig kövesse a címke utasításait

Felhasználás előtt alaposan felrázandó.

Töltse fel a permetezőgépet tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adjon hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

Keverhetőség/együttes alkalmazás

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja.

Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

Figyelmeztetés

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítson meg minden eszközt.

Tárolás

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Ővja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (*40°C feletti hőmérséklettől*) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

Értékesítési feltételek

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

DOZE SI MOMENT DE APLICARE

Brocoli, Conopida, Varză: 3 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

Căpșuni în câmp: 2 aplicări de 1-1,5 l/ha începând cu faza de mugure alb și se poate repeta după 10-14 zile. De asemenea, se poate aplica 2 l/ha pentru creșterea după recoltarea fructelor.

Doza de apă: 200-600 l/ha.

Cartof: o aplicare sau două de 1-2 l/ha la interval de 7 - 14 zile, după apariția 100% a creșterilor vegetative (frunze) până la 20 de zile după inițierea tuberculilor, urmată de o analiză a pețiului.

Doza de apă: 50-400 l/ha.

Ceapă: 1-2 l/ha de îndată ce există suficiente frunze pentru a intercepta pulverizarea. O a doua trecere poate fi făcută după 10 - 14 zile.

Doza de apă: 200 l/ha.

Cireș: 1-2 l/ha la faza de înfrunzire și din nou la buton alb, sau 3 aplicări a câte 1 l/ha, sau 2 aplicări de 2 l/ha după căderea petalelor repetând la interval de 7-14 zile. Toamna, 2 - 3 l/ha, după recoltare dar înainte de căderea frunzelor. Doza de apă: 500-1000 l/ha.

Fasole, Mazăre: 2 l/ha la faza de 10-15 cm. Pentru deficiență moderată până la severă se poate repeta la interval de 10-14 zile.

Doza de apă: 200 l/ha.

Floarea Soarelui: 2-3 l/ha începând cu stadiul de 2 perechi de frunze până la faza de buton. Tratamentul se repetă dacă este necesar la un interval de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha

Măr, Păr: 1 până la 2 l/ha la faza de buton roz, de la începutul înfloritului și se repetă la căderea petalelor. 2-3 l/ha după recoltare, dar înainte de căderea frunzelor. Doza de apă: 500-1000 l/ha.

Morcov: 3 l/ha la faza de 15 cm a frunzelor. Pentru deficiență moderată până la severă se poate repeta la interval de 10-14 zile.

Doza de apă: 200 l/ha.

Porumb: 3 l/ha la faza de 4-8 frunze. Pentru deficiență majoră se poate repeta după 10-14 zile. Doza de apă 50-200 l/ha. Aplicare la sol 5 l/ha

Prun: Primăvara 1-2 l/ha la faza de înfrunzire și din nou la buton roz, sau 3 aplicări a câte 1 l/ha, sau 2 aplicări de 2 l/ha după căderea petalelor repetând la interval de 7-14 zile. Toamna, 2 - 3 l/ha, după recoltare dar înainte de căderea frunzelor. Doza de apă: 500-1000 l/ha.

Rapiță (de iarnă): Pentru o singură aplicare 3 l/ha, la alungirea tulpinii. Pentru deficiență moderată, 3 l/ha în faza de 4 la 6 frunze și 3 l/ha la alungirea tije. Se poate face fertilizare suplimentară după 10-14 zile până la începutul înfloririi. Doza de apă: 50 până la 200 l/ha

Ridichi: în câmp deschis - 2 l/ha la faza de 4-6 frunze, se repetă doza de mai sus la intervale de 10-14 zile în caz de deficiență moderată până la severă. Doza de apă: 200 l/ha.

Culturi protejate: 0,1 litri la 100 litri de apă concentrație maximă. Doza de apă: 1000 l/ha maxim. Consultați cultura echivalentă cultivată în câmp pentru momentul aplicării.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNTODEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETA

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând **continuu**. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, îngheț, ploaie, sau când sunt previziuni de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (*temperaturi peste 40° C*). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.