

Primjena/doze primjene.

Jabuka: 3 do 8 primjena od 10 l/ha u vremenskim intervalima od 10 do 14 dana počevši od opadanja latica. Količina vode: najmanje 200 l/ha. Za crvenu boju: Seniphos 10 l/ha u najmanje 500 l/ha minimalno i 1000 l/ha maksimalno vode povećava crvenu boju. Seniphos treba nanositi sam i ne miješati s agrokemikalijama i / ili bilo kojim drugim aditivom u spremniku. Jednu ili dvije primjene (s razmakom od 7 dana) trebalo bi napraviti nakon što plod počne mijenjati boju, obično 2 do 3 tjedna prije žetve.

Krumpir: Za poticanje ranog rasta: 10 l/ha tjedan dana nakon nicanja 100% usjeva. Za povećanje broja gomolja: 15 l/ha kod inicijacije gomolja (kada je 50 posto vršnih oteklina dvostruko veće od promjera ostatka stolona). Za povećanje veličine gomolja: najmanje 2 aplikacije od 5 do 10 l/ha tijekom rasta gomolja (čim prvi oblikovani gomolji imaju promjer od 10 mm) i nakon analize peteljki tijekom debljanja gomolja. Razmak 10 do 14 dana između aplikacija. Količina vode: 75 do 200 l/ha.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi
Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indikacijskog lijevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

TANK MIX Kompatibilnost (miješanje)

Strogo se pridržavati uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvoda pregledajte www.tankmix.com za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

Upozorenje

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja. Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

Skladištenje

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Ostraniti sadržaj u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Uvjeti prodaje

Ograničeno jamstvo i ograničene odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neubičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojim slučajevima odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvaća ove uvjete prodaje.

A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

Alma: 3-8 kezelés 10 l/ha dózissal, 10-14 naponként ismételve, szőlőlevél hullás után. Permetlémmennyiség: 200 l/ha minimum Szinezésre: 10 liter/ha adagban, 500-1000 l/ha permetlémmennyiséggel kijuttatva. Seniphosot ebben az esetben tilos keverni növényvédőszerrel, egyéb adalékanyagokkal, csak önmagában adható ki. 1-2 kezelés szükséges (7 nap kihagyással) amikor a szineződés megindul, általában 2-3 héttel a betakarítás előtt.

Cseresznye, őzdi barack: 2-5 kezelés 10 l/ha adagban, 7-14 naponként megismételve, szőlőlevél hullás után.

Permetlémmennyiség: 500-1000 l/ha.

Földieper: Nem folytonérő fajtáknál: 3 kezelés, 10 l/ha adagban, a virágzástól elkezdve, 7-10 naponként megismételve. Folytonérő fajtáknál, a tenyészidőszak alatt 30 l/ha mennyiségben juttassuk ki, 6 kezeléssel kezelésenként 5 l/ha adagban. 10-14 naponként lehet leghamarabb a kezeléseket megismételni.

Permetlémmennyiség: 200-600 l/ha

Szőlő: 10 l/ha kötődéstől, 2-4 alkalommal ismételve, 10-14 naponként. Permetlémmennyiség: 500 l/ha.

Használati utasítás

Mindig kövesse a címke utasításait

Felhasználás előtt alaposan felrándozni.

Töltse fel a permetezőgépet tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

Keverhetőség/egytűtes alkalmazás

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az egytűtes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek egytűtes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

Figyelmeztetés

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza.

Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előreljelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítson meg minden eszközt.

Tárolás

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (40°C feletti hőmérséklettől) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

Értékesítési feltételek

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használati feltételei, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

DOZE SI MOMENT DE APLICARE

Ardei gras (cultura în câmp): Până la 4 aplicări a câte 5 L/ha începând cu înflorirea până la al doilea etaj de rod. Se repetă la 10-14 zile. Doza de apă 500L/ha.

Cartofi: Pentru stimularea dezvoltării timpurii: 10L/ha la o săptămână după răsărirea integrală a culturii. Pentru creșterea numărului de tuberculului se recomandă 15 l/ha după inițierea tuberculilor (când 50% din vârful de creștere prezintă proeminențe, dar sunt de două ori mai mari decât restului stolonului) Pentru creșterea dimensiunii tuberculilor: un minim de 2 aplicări cu 5-10L/ha în timpul formării tuberculilor (îndată ce primii tuberculi formați au 10mm diametru) urmată de o analiză a pețiolului. Se recomandă 10-14 zile între aplicări. Doza recomandată de apă: 200L/ha.

Cireșe: Între 2 și 5 aplicări de 10L/ha (alternativ 3 aplicări a câte 12,5 l/ha) la un interval de 7-14 zile începând din momentul căderii petalelor. Doza de apă recomandată: 500 până la 1000L/ha.

Măr: 3 până la 8 aplicări a câte 10L/ha la un interval de 10-14 zile începând de la căderea petalelor. Doza de apă recomandată: minim 200L/ha Pentru intensificarea culorii în roșu: doza de 10L/ha, îmbunătățește colorarea în roșu. Doza de apă recomandată minim 500L/ha și maxim 1000L/ha. Trebuie aplicat singur nu în amestec cu alte substanțe sau aditivi. Una sau două aplicări la un interval de 7 zile începând cu momentul în care fructul începe să își schimbe culoarea, în condiții normale cu 2-3 săptămâni înainte de recoltare.

Cais, Nectarin, Piersic, Prun: Între 2 și 5 aplicări de 10L/ha (alternativ 3 aplicări a câte 12,5 l/ha) la un interval de 7-14 zile începând din momentul căderii petalelor. Doza de apă recomandată: 500 până la 1000L/ha Trebuie aplicat singur nu în amestec cu alte substanțe sau aditivi. Una sau două aplicări la un interval de 7 zile începând cu momentul în care fructul începe să își schimbe culoarea, în condiții normale cu 2-3 săptămâni înainte de recoltare.

Vita de vie: 10L/ha la formarea fructului cu repetare de 2 până la 4 ori la un interval de 10-14 zile. Doza de apă recomandată: 500L/ha.

Pentru recomandări la mai multe culturi contactați un reprezentant Yara

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNTOÎDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte încetă, îngheț, ploaie, sau când sunt previzionări de îngheț și ploaie.

Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (*temperaturi peste 40°C*). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.