



## HR

### Upozorenje

Opasni sastojci: kalcijev klorid  
H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
P280: Nositi zaštitna sredstva za oči.  
P264: Nakon rukovanja temeljito oprati ruke.  
P305+P351+P338+P337+P313: U SLUČAJU  
DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom  
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko  
ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti  
ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje: Dobijte  
liječničku pomoć.

## HU

### Figyelem

Veszélyes összetevő: Kalcium-klorid  
H319: Súlyos szemirritációt okoz.  
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő  
használatra kötelező.  
P264: A használatot követően a kezeket alaposan  
meg kell mosni.  
P305+P351+P338+P337+P313: SZEMBE  
KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több  
percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék  
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés  
folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi  
ellátást kell kérni.

## RO

### Atenție

Ingrediente periculoase: clorură de calciu  
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
P280: Purtați echipament de protecție a ochilor.  
P264: Spălați-vă bine mâinile după manipulare.  
P305+P351+P338+P337+P313: ÎN CAZ DE  
CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp  
de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact,  
dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu  
ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor  
persistă: Consultați medicul.



## Primjena/doze primjene.

**Brokula, Cvetjača, Kupus:** primijeniti 2 do 3 aplikacije u dozi 5,0 lit/ha od razvoja stabljike/stvaranja glave do berbe.

Razmak između primjene 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Celer:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha rano u sezoni. Ponoviti u razmacima od 10-14 dana po potrebi.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Jabuka:** primijeniti u dozi 2,0-5,0 lit/ha od pupanja i ponavljati u razmacima od 7-10 dana po potrebi do početka cvatnje.

Redovita primjena od 5,0-10,0 lit/ha u razmacima od 7-14 dana od opadanja latica do tjedan dana prije berbe.

Preporučena količina vode: 150-500 lit/ha.

**Jagoda (vanjski uzgoj):** 3 primjene u dozi 10,0 lit/ha od početka cvatnje. Ponoviti primjenu u razmacima 7-10 dana.

Preporučena količina vode: 300-600 lit/ha. Za mjesecarke: Podijelite ukupnu količinu od 30 lit/ha u 6 aplikacija od 5 lit/ha.

Nemojte primjenjivati uzastopne aplikacije u intervalima manjim od 10 do 14 dana. Količina vode: 200 do 600 lit/ha.

**Kumpir:** 2 do 3 primjene u dozi 5,0-10,0 lit/ha s početkom zametanja gomolja (kada je 50% zadebljanih vrhova dvostrukog promjera od ostatka gomolja) u razmacima od 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Kruška:** redovna primjena u dozi 5,0-10,0 lit/ha u razmacima od 7-14 dana od opadanja latica do tjedan dana prije berbe.

Preporučena količina vode: 150-500 lit/ha.

**Luk:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha kod bubrenja lukovice. Ponoviti primjenu u razmacima od 10-14 dana po potrebi.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Mrkva:** 2 do 3 primjene u dozi 5,0 lit/ha kod visine biljke 10-15 cm ili kad je dovoljno velika lisna površina za folijarnu primjenu. Razmak između primjene 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Pastrnjak:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha kada je usjev visok 15 cm. Za umjereni do ozbiljan nedostatak ponoviti primjenu u razmacima od 10-14 dana (3 primjene maksimalno).

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Poriluk:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha dva tjedna nakon presađivanja ili u slučaju direktne sjetve kada je usjev visok 15 cm. Ponekad je potrebno ponoviti primjenu u razmacima od 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Salata (vanjski uzgoj):** 2 do 3 primjene u dozi 5,0 lit/ha s početkom 10-14 dana nakon presađivanja ili nicanja s razmacima od 10-14 dana.

Preporučena količina vode: 500 lit/ha.

**Trešnja, Šljiva:** 2 primjene u dozi 10 lit/ha, 4 tjedna i 2 tjedna prije berbe. Preporučena količina vode: 500 lit/ha.

**Žitarice:** primijeniti u dozi 5,0 lit/ha od faze 4 lista do pojave drugog koljenca (Zadok G.S. 14-32).

Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

**Uzgoj u zaštićenom prostoru:** 0,5 litara na 100 litara vode maksimalna koncentracija . Količina vode: maksimum 1000 l/ha. Pogledajte odgovarajuću kulturu na otvorenom uzgoju za vrijeme primjene.

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi

Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indukcijskog lijevka, uz stalno miješanje. Nadopunite spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

## TANK MIX KOMPATIBILNOST (MIJEŠANJE)

Strogo se pridržavajte uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinaciji s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka uoput kontrole Yare.

Prije miješanja proizvoda pregledajte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

## UPOZORENJE

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno.

Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju i ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed ne stručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja. Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitić za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

## SKLADIŠTENJE

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

## UVJETI PRODAJE

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvata ove uvjete prodaje.



**Felhasználási javaslat.****LOMBKEZELÉS**

**Alma:** 5-10 l/ha adagban, 7-14 naponként, a szíromhullástól a várható betakarítás előtti hétig.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha.

**Burgonya:** 2-3 kezelés, 5-10 l/ha adaggal gumó képződés kezdetétől (amikor a sztoló hajtás csúcsok 50 százaléka kétszeresére duzzadt a normal átmérőnek), majd a gumó növekedés alatt 10-14 naponként ismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha.

**Cseresznye:** 2-4 kezelés, 5-10 l/ha adaggal, a kötődés után folyamatosan, 10-14 naponként. A betakarítás előtt 2-3 héttel már nem javasolt a használata.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha.

**Görögdinnye (szabadföldi):** 2-3 kezelés, 5 l/ha adaggal, kötődéstől kezdve, 7-10 naponként ismételve.

Vízigény: 300-600 l/ha.

**Körte:** 2-3 kezelés, 5-10 l/ha adaggal, szíromhullástól 10-14 naponként. Az utolsó kezelés a betakarítás előtti 2. héten legyen. Szükséges vízmennyiség :minimum 200l/ha.

**Paprika (Szabadföldi):** 5 l/ha adagban, 4-5 alkalommal, virágzástól folyamatosan a második-harmadik terméskötődésig. Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha.

**Szabadföldi paradicsom:** 5 l/ha adagban virágzástól folyamatosan a második-harmadik terméskötődésig, 7-14 naponként ismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha.

**Szamóca (szabadföldi):** Nem folytonó fajtáknál; 3 kezeléssel 5-10 l/ha adagban, a virágzástól kezdve, 7-10 naponként ismételve. Folytonó fajtáknál, a tenyészidőszak alatt 30 l/ha mennyiséget kell kiadni, 6 kezeléssel, kezelésenként 5 l/ha adagban, 10-14 naponként ismételve.

Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha.

**Szilva:** 2-4 kezelés, 5-10 l/ha adaggal, a kötődés után folyamatosan, 10-14 naponként. A betakarítás előtt 2-3 héttel már nem javasolt a használata.

Szükséges vízmennyiség: 200l/ha.

**Szőlő:** Terméskötődés után 5-8 l/ha adagban, 7-14 naponként ismételve zsendülésig.

Szükséges vízmennyiség: minimum 500l/ha.

**Uborka (szántóföldi termesztés):** 2-3 alkalommal 5 l/ha mennyiséget juttassunk ki terméskötődéstől, 7 naponta ismételjünk. Lémennyiség: 200 l/ha. Vagyilagosan: 0,4% töménységben permetezzük közvetlenül a fiatal termésre. (0,4 l 100 l vízben.)

**Használati utasítás**

Mindig kövesse a címke utasításait

Felhasználás előtt alaposan felrázandó.

Töltse fel a permetezőgép tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

**Keverhetőség/együttes alkalmazás**

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja.

Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

**Figyelmeztetés**

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárási viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítson meg minden eszközt.

**Tárolás**

Tárolja hűvös, száraz növényvédőszer raktárban.

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (40°C feletti hőmérséklettől) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

**Értékesítési feltételek**

Ez a termék az eladói értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

# RO YaraVita Stopit™

## DOZE SI MOMENT DE APLICARE

**Ardei de câmp:** Aplicare standard 5l/ha de la înflorire până la legarea celui de al doilea etaj de rod.  
Volum de apă: 50-500 l/ha.

Stropire direct pe fructele tinere, folosind 0,4 litri la 100 litri de apă. Cantitate maximă de apă: 1000 l/ha Alternativ: una până la patru aplicări de 5 l/ha de la înflorire până la al doilea etaj de rod. Volum de apă: 50-500 l/ha.

**Brocoli, Varză, Conopidă:** 2-3 stropiri a 5 litri/ha de la formarea căpășanii până la recoltare. Intervalul între stropiri: 10-14 zile. Volum de apă: 200 litri/ha.

**Cartof:** 2-3 stropiri a câte 5-10 litri/ha începând cu formarea tuberculilor. Intervalul între stropiri: 10-14 zile.  
Volum de apă: 200 litri/ha.

**Căpșuni (de grădina):** Soiuri ne-remontate: 3 aplicări de câte 10 l/ha de la începutul înfloritului la un interval de 7-10 zile. Soiurile remontate: Împărțiți doza de 30 l/ha în 6 aplicări a câte 5 l/ha. Nu aplicați la intervale mai mici de 10-14 zile.  
Volum de apă: 200-600 l/ha.

**Ceapă:** 5-10 litri/ha de la apariția bulbului. Dacă este nevoie se repetă la intervale de 7-14 zile. Volum de apă: 200 litri/ha.

**Cais, Cireș, Păr, Prun:** Aplicări regulate de 5 până la 10 l/ha la intervale de 7 până la 14 zile după căderea petalelor până la o săptămână înainte de recoltare. Volum de apă: 150-500 l/ha. Alternativ: 2 aplicări de 10 l/ha aplicate înainte de recoltare cu 4 săptămâni și respectiv 2 săptămâni. Volum de apă: 150-500 l/ha.

**Măr:** 2-5 l/ha aplicare de la deschiderea mugurilor până la începutul înfloritului, se repetă la intervale de 7-10 zile după cum este necesar. Aplicările periodice de 5-10 l/ha se fac la intervale de 7-14 zile de la căderea petalelor până la o săptămână înainte de recoltare. Volum de apă: 150-500 l/ha. Tratatamentul după recoltare (scufundare și/sau spălare): orice referire la Stopit după recoltare a fost retrasă și nu se mai recomandă.

**Morcov:** 2-3 stropiri a câte 5 litri/ha la stadiul de 10-15cm înălțime a plantei. Se repetă la intervale de 10-14 zile.  
Volum de apă: 200 l/ha.

**Pepe verde:** 5l/ha, 2-3 tratamente, începând după legarea fructelor la un interval de 7 zile. Volum de apă: 200 l/ha.

**Salată (de grădina):** 2-3 stropiri a câte 5 litri/ha după 10-14 zile de la răsărire la un interval de 7-14 zile între stropiri.  
Volum de apă: 50-500 l/ha.

**Tomate de câmp:** 5l/ha de la înflorire până la al doilea etaj de rod. Volum de apă: 50-500 l/ha. Interval de stropire 7-14 zile. Opțional: Stropire direct pe fructele tinere, folosind 0,4 litri la 100 litri de apă. Cantitate maximă de apă: 1000 l/ha.

**Vița de vie:** 7-10 l/ha după legarea fructelor la intervale de 7-14 zile. Volum de apă: 500-1000 l/ha

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### ÎNTOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETA

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

### COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

### PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, îngheț, ploaie, sau când sunt previzionări de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

### DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (temperaturi peste 40°C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

### CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.