

YaraVita Stopit™

KÄYTTÖMÄÄRÄ JA AJANKOHTA

Kasvihuone/tunneli: 0,5 l/100 l vettä maksimi käyttöväkevyys. Vesimäärä: Enintään 1000 l/ha. HUOM: Älä ylitä käyttömäärää 50 ml/10 l vettä / 100 m². Käsittelyajankohta sama kuin avomaalla viljelyssä.

Kirsikka: 10 l/ha. 2 käsittelyä 4 ja 2 viikkoa ennen sadonkorjuuta. Vesimäärä 500 l/ha

Mansikka: 10 l/ha. 3 käsittelyä 7-10 päivän välein kukinnan alusta alkaen. Taimet jotka olleet hiljattain harson alla voivat olla herkkiä ruiskutusvioletukselle. Vesimäärä 200-600 l/ha

Mustaherukka: 7-10 l/ha. Käsittele kasvusto 7-14 päivän välein marjanmuodostuksen alusta alkaen. Vesimäärä vähintään 200 l/ha

Omena: Ennen kukintaa: 5 l/ha 7-10 päivän välein silmujen puhkeamisesta kukinnan alkuun asti. Kukinnan jälkeen: Toistuva käsittely 10 l/ha 7-14 päivän välein terälehtien putoamisesta alkaen (BBCH67) 1 viikko sadonkorjuuseen asti. Vesimäärä 150-500 l/ha

Päärynä: Kukinnan jälkeen: Toistuva käsittely 10 l/ha 7-14 päivän välein terälehtien putoamisesta (BBCH67) 1 viikko sadonkorjuuseen asti. Vesimäärä: 150-500 l/ha

Pensasmustikka: Ensimmäisestä satovuodesta alkaen: 10 l/ha kymmenen päivän kuluttua kukinnan loputtua. Toista käsittely 1-3 kertaa 10-14 päivän välein. Vesimäärä: 500-1000 l/ha.

Salaatti (avomaa): 5 l/ha. 10-14 päivää istutuksen tai taimettumisen jälkeen. Tarvittaessa uusi käsittely 2-3 kertaa 7-14 päivän välein. Vesimäärä 200-500 l/ha.

Vadelma: 10 l/ha. 3 käsittelyä; kukinnan alussa, kukinnan lopussa ja marjan muodostumisen aikaan. Vesimäärä: 200-500 l/ha

KÄYTTÖOHJEET

NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.

Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliö suodattimen läpi vedellä, kolme neljäsosaa tarvittavasta vesimäärästä, sekoittaen samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKKISEOKSET / YHTEISKÄYTTÖ

Lue kaikki etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita. Eri tuotteiden sekoitus tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ennen tankkiseoksen tekemistä tutustu tärkeisiin tietoihin www.tankmix.com. Voit myös ottaa yhteyttä Yaran neuvontaan lisäohjeita varten

TURVAOHJEET

Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Vältä käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa. Käytä sopivia käsineitä ja kasvusuojainta käsitellessäsi tätä tuotetta. Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön.

VARASTOINTI

Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa jäätymiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta. (lämpötila yli 40°C). Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

MYNTIEHDOT

Tuotteet myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka on saatavilla pyynnöstä. Käyttämällä Tuotteita käyttäjä hyväksyy nämä myyntiehdot

DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT

Esler: Før blomstring: 0,2-0,5 l/daa fra knoppskyting og gjentas hver 7-10 dag frem til begynnende blomstring. Etter kronbladfall (BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers intervall frem til 1 uke før høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass behandlingene slik at siste behandling skjer 1 uke før høsting.

Bringebær, Jordbær: 1 l/daa i 15-50 l vann. 3 behandlinger med 7-14 dagers intervall fra begynnende blomstring. Bringebær under plast eller glass, og planter der dekke eller klimatefolie nettop er fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade. Minske doseringen her til 0,3 l/daa i 60 l vann.

Kirsebær, moreller og plommer: 1,0 l/daa i 15-50 l vann. 2 behandlinger, 4 og 2 uker før høsting.

Dosering til moreller under tak: 0,3 l/daa i 60 l vann.

Pærer: Etter kronbladfall (BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers intervall frem til 1 uke før høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass behandlingene slik at siste behandling skjer 1 uke før høsting.

Potet: 0,5-1,0 l/daa. 2-3 behandlinger rett etter begynnende knolldannelse, når 50% av stolonenes toppar har doblet sin diameter. Behandles med 10 til 14 dagers intervall. Vannmengde 20 l/daa.

Salat (friland): 0,5-1,0 l/daa, 10 til 14 dager etter planting. Gjentas 2-3 ganger med 10 til 14 dagers intervall ved behov. Vannmengde: 5 til 50 liter/daa.

BRUKSANVISNING

Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten.

Vend/risr kannen før bruk. Fyll tanken ¾ full med vann. Tilfør deretter produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under omrøring. Fyll på med vann og fortsatt å røre til sprøytingen er ferdig.

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER

Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger om hvordan produktet/produktene kan brukes sammen med andre. Mange faktorer som kan virke inn på produktens effekt ved samsprøyting ligger utenfor Yaras kontroll. Av den grunn må samsprøyting gjøres på brukerens egen risiko. Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å bruke en produktblanding en ikke har erfaring med. Før samsprøyting av produkt, bør man sjekke den fysiske blandbarheten på www.tankmix.com. Yaras Tankmix app for smarttelefon, eller eventuelt kontakte Yara Norge AS for råd.

FORSIKTIGHETSREGLER

Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast, dersom det ikke er spesifikt anbefalt på etiketten. Ved dyrking i tunnel: 0,5 l pr 100 l vann er maks. konsentrasjon. Bruk ikke mer enn 100 l vann/daa. Unngå sprøyting under ekstremer værforhold, for eksempel ved sterk tørke, frost, regn eller hvis det ventes frost eller regn. Bruk egnete hansker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres. Alt utstyr skal rengjøres før og etter bruk. Sikkerhetsdatablad for produktet finnes på www.yara.no

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier og som er utlignegelig for barn og husdyr. Må beskyttes mot frost og ekstremer værforhold (temperaturer over 40°C). Tomemballasje og evt. innhold skal deponeres i henhold til norske regler for avfallshåndtering

SALGSBETINGELSER

Dette produktet er solgt i henhold til Yaras generelle salgsbetingelser, som er tilgjengelige ved henvendelse til Yara Norge AS. Yaras generelle salgsbetingelser anses som akseptert av kjøper når produktet er tatt i bruk.

BEHANDLINGSTIDSPUNKT OG DOSERING

Apple: Før blomstring: 5 l/ha vid knoppskyting og opprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen. Etter blomning: Opprepede behandlingar med 10 l/ha var 7 till 14:e dag från kronbladens fall (avblomning BBCH57), fram till 1 vecka före skörd. Vattenmängd 150-500 l/ha.

Jordgubbar (friland): 10 l/ha. 3 behandlingar med 7-10 dagers intervall från begynnande blomning. Plantor som nyligen avtäckts kan vara känsliga för sprutskador. Vattenmängd 500 l/ha.

Plommon och körsbär: 10 l/ha. 2 behandlingar 4 och 2 veckor innan skörd. Vattenmängd 500 l/ha.

Päron: Etter blomning: Opprepede behandlingar med 10 l/ha var 7 till 14:e dag från kronbladens fall (avblomning BBCH67), fram till 1 vecka före skörd. Vattenmängd 150-500 l/ha

Potatis: 5-10 l/ha. 2-3 behandlingar strax etter begynnande knölbildning, når 50 % av stolonernas toppar har fordubblat sin diameter. Behandlingarna utføres med 10 till 14 dagers intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Salat (friland): 5 l/ha, 10 till 14 dagar etter plantering eller oppkomst. Vid behov, opprep 2-3 ganger med 10 till 14 dagars mellomrum. Vattenmängd 200 l/ha.

BRUKSANVISNING

FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.

Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tilför produktet genom påfyllningsfiltret under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående. Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballage: Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Vid rengjort tomemballage lämnas till anvisat återvinningsställe.

TANKBLANDNINGAR/SAMPLICERINGAR

Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din rådgivare överväger en tankblanding besök www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING

Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb torkning, extremt långsamt torkning, frost, regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning.

FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (temperaturer över 40°C). Överblivet produkt kan spridas på åker enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av produktinnehåller att kjøperen har godkänt försäljningsvillkoren.



5 037704 008495 >