

Solatrel

DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT

Potet:

For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting (krokstadiet fram til stolonene er 2x stolontykkelsen).

For å øke knollstørrelsen: 1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst (de første knollene er 10mm tykke) sprøyt igjen 10-14 dager senere. 20 liter vann pr daa.

Bønner, erter: 500 ml/daa når plantene er 10-15cm høye. Gjenta ved behov med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr daa.

Brokkoli, rosekål, kål, blomkål og kålrot: 500 ml/daa etter planting på 4-6 bladstadiet. Gjenta ved behov med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.

Gulrot: 500 ml/daa når plantene er 10-15cm høye. Gjenta ved behov med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.

Purre: 500 ml/daa fra to uker etter planting. Direktesådd purre behandles når plantene er 15 cm høye. Ved behov gjenta med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.

Salat (firland): 500 ml/daa 10-14 dager etter planting eller spiring (direktesådd). Ved behov gjenta en eller to ganger med 10-14 dagers intervall. 50 liter vann pr daa.

Mais: 500 ml/daa på 4-8 bladstadiet. Ved behov gjenta med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.

Løk: 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Gjenta ved behov etter 10-14 dager og 1-2 behandlinger når løken fylles med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.

Pastinakk: 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved synlig mangel, gjenta med 10-14 dagers intervall (maksimum 3 behandlinger). 20 liter vann pr daa.

Rødbete: 500 ml/daa på 4-6 bladstadiet. Ved synlig mangel, gjenta med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.

Kålrot/nepe: 500 ml/daa etter planting på 4-6 bladstadiet. Gjenta ved behov med 10-14 dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.

BRUKSANVISNING

Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten. Vend kannen før bruk. Fyll tanken $\frac{3}{4}$ full med vann. Tilfør deretter produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under omrøring. Fyll på med vann og fortsatt å røre til sprøytingen er ferdig. Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast.

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER

Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger om hvorvidt produktet/produktene kan brukes sammen med andre. Mange faktorer som kan virke inn på produktenes effekt ved samsprøyting ligger utenfor Yaras kontroll. Av den grunn må samsprøyting gjøres på brukerens egen risiko. Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å bruke en produktblanding en ikke har erfaring med. Før samsprøyting av produkter, bør man sjekke den fysiske blandbarheten på www.yara.no.

FORSIKTIGHETSREGLER

Unngå sprøyting under ekstreme værforhold, for eksempel ved sterk tørke, frost, regn eller hvis det ventes frost eller regn. Bruk egnede hansker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres. Alt utstyr skal rengjøres før og etter bruk.


HMS-datablad for produktet finnes på www.yara.no

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier og som er utilgjengelig for barn og husdyr. Må beskyttes mot frost og ekstreme værforhold (temperaturer over 40°C).

GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Yara garanterer at produktet i den uåpnede emballasjen stemmer med den kjemiske spesifikasjonen på etiketten. Ettersom værforhold, jordsmonn samt hvordan produktet anvendes ligger utenfor Yaras kontroll, er bruker selv ansvarlig for eventuell risiko i forbindelse med lagring eller bruk av dette produktet.



7 090014 140093